
환자중심 의료기술 최적화 연구사업 데이터 활용 지침서

DB명: 자살사고를 가진 주요우울장애 환자를 대상으로 한
병원 기반 집중 사례관리의 효과 평가: 전향적, 다기관, 무작위
비교연구

Version 1.0 (2024. 12.)



PATient-CENtered Clinical Research Coordinating Center

환자중심 의료기술 최적화 연구사업단

목 차

I. 기본 안내사항	3
1. 사업개요	3
2. 비식별화 과정	3
3. 자료분양 절차 및 유의사항	4
II. 연구개발과제 데이터 소개	6
1. 연구개발과제 개요	6
2. 데이터 구조	8
3. 데이터 정제	11
4. 표본 유지율 및 대상자 특성	14
5. 주요변수 통계표	18
III. 변수 설명서	26
1. 변수 상세 설명	26
2. 변수 목록	82
IV. 부록	97
1. 연구대상자 선정 · 제외기준	97
2. 주요 선행연구 목록	97
3. Annotated CRF	98

1. 기본 안내사항

1. 사업개요

(1) 목적

환자중심 의료기술 최적화 연구사업(이하, PACEN)은 인·허가 이후 보건의료 현장에서 사용되는 다양한 의료기술의 효과성·안전성·비용효과성 등 근거창출 목적의 연구자주도 공익적 임상연구를 지원하는 국가 R&D 사업입니다.

PACEN은 전향적 임상연구에서 수집·구축한 임상연구데이터를 지속 활용하여 공익적 임상연구를 활성화하고자 연구 목적에 한하여 임상연구데이터를 공개 및 분양합니다.

(2) 관계법령

PACEN 임상연구 데이터는 아래의 법률에 의거하여 공개 및 활용됩니다.

※ 국가연구개발혁신법 제16조(연구개발성과의 소유·관리)

- ④ 중앙행정기관의 장은 공공의 이익을 목적으로 연구개발성과를 활용하기 위하여 필요한 경우 연구개발성과를 국가의 소유로 할 수 있다.

※ 국가연구개발혁신법 제17조(연구개발성과의 활용)

- ④ 중앙행정기관의 장은 연구개발성과의 공동활용을 위하여 필요한 지원을 하여야 한다.

2. 비식별화 과정


PACEN 임상연구데이터는 개인정보보호를 위해 ‘보건의료데이터 활용 가이드라인(보건복지부)’에 의거하여 데이터 유형에 따라 가명처리가 적용됩니다. 데이터 유형별 가명처리 방법의 예는 다음과 같습니다.

※ 데이터유형별 가명처리 방법 예시	
식별자	일부 또는 전부를 삭제하거나 일련번호로 대체
주요인적사항	삭제하거나 연구목적 상 유의미한 일부 정보를 발췌하는 방식으로 식별력을 충분히 낮춤
측정수치정보	별도의 조치 불필요. 단, 특이정보 포함 등 필요 시 비식별처리
자유입력데이터 (문자열)	전수 또는 키워드 검사 등을 통해 식별 위험성이 있는 정보 일부 삭제 또는 대체

3. 자료분양 절차 및 유의사항

(1) 자료분양절차

PACEN 임상연구데이터는 대학, 국·공립 및 사립병원, 또는 연구기관 등에 소속된 연구자를 대상으로 분양하고 있습니다. 본 데이터는 한국보건 의료연구원 자료심의위원회의 심의를 거쳐 제공되며, 심의 후 'PACEN 데이터 이용 계약서' 제출이 필요합니다. 데이터는 한국보건 의료연구원 자료분석실 분석전용 PC 내 폐쇄망을 통해 제공됩니다.



(2) 데이터 활용 시 유의사항

○ PACEN 임상연구데이터 활용 시 아래 사항을 유의하 주시기 바랍니다.

PACEN 임상연구 데이터 활용 유의사항	
데이터 활용 명시	(국문) 본 연구는 보건복지부의 재원으로 수행된 「환자중심 의료기술 최적화 연구사업」 선정과제(과제고유번호: RS-2019-KH082897)의 데이터를 활용하였음 (영문) The data used in this study was originally collected from 「Patient-Centered Clinical Research Coordinating Center」 research(grant number: RS-2019-KH082897) granted by the Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea.
양도/대여 금지	자료요청 절차에 따라 PACEN 임상연구 데이터를 받은 기관 혹은 개인이 아닌 경우, PACEN 임상연구 데이터를 사용한 연구결과를 논문이나 연구보고서 등에 게재 및 출판 금지
영리적 목적으로 사용 금지	본 데이터는 학술활동 및 정책 개발등의 비영리적인 목적으로만 이용가능(타인에게 판매 금지)
데이터 이용 승인기간 준수	이용자는 이용 승인기간 내에만 데이터 이용 가능
산출물 보고	논문 및 연구결과 발표, 정책보고서 등 작성 시 데이터 활용에 대한 명시 및 PACEN 사사표기를 포함하여야 하며, 산출물이 발생하는 경우 30일 내에 PACEN 담당자에게 사본을 이메일로 제출 (pacen2@neca.re.kr)

- ‘자살사고를 가진 주요우울장애 환자를 대상으로 한 병원 기반 집중 사례관리의 효과 평가: 전향적, 다기관, 무작위 비교연구’ DB는 연구대상자 등록이 완료되어 추가적인 대상자 등록은 없으나 추적관찰이 진행 중입니다. 향후 추적관찰 종료 후 데이터가 추가 공개될 수 있습니다.
- 본 데이터 활용 지침서(Ver 1.0)는 연구데이터 생산 연구자가 작성하였으며, 이후 지침서는 비정기적으로 업데이트 됩니다. 데이터 사용시 PACEN 임상연구데이터 리포지터리 (<https://repository.neca.re.kr>)에서 최신 버전의 지침서를 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 기타 데이터 및 지침서에 대한 문의사항은 pacen2@neca.re.kr 또는 한국보건 의료연구원 환자중심 의료기술 최적화 연구사업단 연구개발2팀(02-2174-2833)으로 연락 주시기 바랍니다.

II. 연구개발과제 데이터 소개

1. 연구개발과제 개요

(1) 데이터 기본 정보

연구설계		전향적, 다기관, 무작위 단일 눈가림 비교 연구	
무작위배정 방법		층화 요인을 고려하지 않은 2블록 무작위배정	
P I C O	연구 대상자(P)	정의	연구 등록 1개월 내에 자살의도를 가진 자살사고 또는 2개월 내에 자살을 시도한 병력이 있으며 주요 우울증의 진단 및 통계 편람(제 5판) (DSM-5) 진단 기준을 충족하고, 임상 평가를 토대로 간이 국제 신경정신과 면담 (MINI)에 의해 확인된 정신병적 소견이 없는 만 18세 이상의 성인 남녀
		대상자수	314명
	중재(I)	정의	시험군 : 정신건강의학과 전문의에 의한 정신치료, 약물치료 등의 정신과적 표준치료 제공과 함께 표준화된 매뉴얼(주기적인 접촉, 치료순응도 향상 개입, 개별화된 지역사회 서비스 연계, 대상자와 가족 대상의 psycho-education 포함)에 따라 집중사례관리 서비스 제공
		대상자수	158명
	비교중재(C)	정의	대조군 : 정신건강의학과 전문의에 의한 정신치료, 약물치료 등의 정신과적 표준치료 제공
대상자수		156명	
관심건강 결과(O)	일차 결과변수: 컬럼비아 자살 심각도 평가척도(C-SSRS)를 통해 측정된 자살 생각, 자살 관련 행동의 변화 이차 결과변수: 우울, 불안, 외로움, 자살 의도의 변화, 병원기반 집중사례관리의 경제성 평가		
임상연구 등록정보	(CRIS) KCT0008123		
프로토콜 논문	- ※ protocol 논문 외 데이터 활용 관련 선행 논문은 '부록 1, 주요 선행논문 목록' 참고		

(2) 연구개발과제 기본 정보

책임연구자(소속)	백종우 (경희대학교 의과대학 의학과)
연구과제명	자살사고를 가진 주요우울장애 환자를 대상으로 한 병원 기반 집중사례관리의 효과 평가 : 전향적, 다기관, 무작위 비교 연구
연구목적	자살사고를 가진 주요 우울증 환자를 대상으로 병원 기반의 집중사례관리 서비스를 제공하고 이에 대한 효과성을 확인하여 근거 기반의 효과적인 자살 예방 시행 기반을 마련하는 것을 목표로 함
연구 수행방법 요약	연구 등록 1개월 이내에 자살 의도를 가진 자살사고 또는 2개월 이내에 자살을 시도한 병력이 있으며 주요 우울증의 진단 및 통계 편람 제5판 (DSM-5) 진단 기준을 충족하고, 임상 평가를 토대로 한 간이 국제 신경정신과 면담 (MINI)에 의해

	<p>확인된 정신병적 소견이 없는 만 18세 이상의 성인 남녀 314명을 대상으로 무작위 배정을 진행함</p> <p>시험군(158명)에게 정신과적 표준치료(정신건강의학과 전문의 정신치료, 약물치료)와 표준화된 매뉴얼(주기적인 접촉, 치료순응도 향상 개입, 개별화된 지역사회 서비스 연계, 대상자와 가족 대상의 psycho-education 포함)에 따라 집중사례 관리 서비스를 6개월 동안 제공하고 대조군(156명)에게 정신과적 표준 치료(정신건강의학과 전문의 정신치료, 약물치료)를 6개월 동안 제공한 후 자살 생각, 자살 관련 행동의 변화를 비교하였음</p>
<p>1차 결과변수</p>	<p>정의 : 컬럼비아 자살 심각도 평가척도 (C-SSRS)를 통해 측정된 자살 생각, 자살 관련 행동의 변화</p> <p>평가 방법 : 시험군과 대조군의 베이스라인 대비 6개월까지의 자살 생각 심각도 점수의 변화(Mann-whitney U test, Wilcoxon signed-rank test, repeated measure ANOVA)와 자살 관련 행동 발생 비율(Chi-square test, Fisher's exact test, repeated measure ANOVA with binary data) 비교</p>
<p>2차 결과변수</p>	<p>정의:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 우울 증상 변화량 2) 자살 의도, 자살 생각 변화량 3) 불안 변화량 4) 외로움 변화량 5) 경제성 평가 <p>평가 방법:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 베이스라인 대비 6개월까지 각 방문에 조사된 Hamilton Depression Scale 총점의 변화량을 제시하고 repeated measure ANOVA로 분석 2) 베이스라인 대비 6개월까지 각 방문에 조사된 Beck's Suicide Intent Scale, Beck's Scale for Suicidal Ideation 총점의 변화량을 제시하고 repeated measure ANOVA로 분석 3) 베이스라인 대비 6개월까지 각 방문에 조사된 Generalized Anxiety Disorder-7 총점의 변화량을 제시하고 repeated measure ANOVA로 분석 4) 베이스라인 대비 6개월까지 각 방문에 조사된 한국판 UCLA 외로움 척도 총점의 변화량을 제시하고 repeated measure ANOVA로 분석 5) 베이스라인 대비 6개월까지 각 방문에 조사된 EQ-5D-3L 척도 총점의 변화량을 제시하고 repeated measure ANOVA로 분석

- 본 연구개발과제에 대한 연구계획서(protocol) 및 통계분석계획(SAP)은 임상연구데이터 분양 신청 승인 후 데이터 분양 시 제공됩니다.

2. 데이터 구조

(1) 변수 생성 구조 : 규칙 없음

(2) 대상자 등록 및 추적관찰

- 2021년 1월 첫 대상자 등록을 시작으로 2024년 1월 마지막 대상자 등록까지 총 314명의 데이터가 수집되었습니다(스크리닝 탈락 제외). VISIT 별 연구 진행 내용은 다음과 같습니다.

VISIT1 (스크리닝)	선정기준에 부합한 대상자 확인
VISIT2 (등록, 무작위배정시행)	선정기준에 부합한 대상자를 대상으로 무작위 배정 실시. 시험군에 배정된 대상자의 경우 사례관리 대상자로 등록하여 개입 시작
VISIT3-6 (추적관찰)	무작위 배정이 시작되는 VISIT2를 기준으로 1개월, 2개월, 3개월, 6개월 간격으로 방문 수행
EOT (연구종료)	연구자가 증례기록서의 모든 항목 검토

○ 임상연구 일정표

구분	스크리닝	등록	추적관찰			
			VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4
방문명	-2주	0일	1개월 (±7일)	2개월 (±7일)	3개월 (±7일)	6개월 (±14일)
동의서	○					
선정/제외기준 확인	○					
인구학적 정보	○					
DSM-5 기준	○					
정신과적 병력	○					
신체 병력	○					
선행약물 및 병용약물	○	○	○	○	○	○
표준치료	○	○	○	○	○	○
무작위배정		○				
집중사례관리서비스 (시험군 대상)		○	○	○	○	○
집중사례관리서비스 만족도 (시험군 대상)			○	○	○	○
치료지속/생활사건 /자살시도		○	○	○	○	○
C-SSRS	○	○	○	○	○	○
SIS	○					○
BSSI	○	○	○	○	○	○
21-items HAM-D	○	○	○	○	○	○
GAD-7	○	○	○	○	○	○
KBIS-11	○					
Loneliness	○	○	○	○	○	○
EQ-5D-3L	○	○	○	○	○	○
CSRI		○	○	○	○	○

○ 주요 수집 항목

도메인명	변수항목
환자선정방문	무작위배정군, 선정기준 및 제외기준 부합 여부
피험자 기초 정보	혼인상태, 동거인, 가족관계, 학력, 종교, 의료보장, 직업, 월평균소득, 신체병력, 음주력
현재 우울증 발현에 대한 병력	현재 에피소드 발생일, 입원여부, 생활사건, 현재 정신과 치료 및 약물 복용 여부, 약물명
가족력	자살가족력, 우울증 가족력, 우울증이 아닌 다른 정신과 질환의 가족력
우울증 및 자살 시도 과거력	과거 우울증 에피소드에 대한 정보, 과거 자살시도에 대한 정보
최근(2개월 이내) 자살시도에 관한 병력	시도방법, 장소, 자살시도 당시 음주 여부, 자살동기
Visit1_ Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)	방문1 C-SSRS 평가 결과
공통_ Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)	방문명, 방문일, C-SSRS 평가 결과
Beck's Suicide Intent Scale (SIS)	방문명, 방문일, SIS 하위 항목 점수 및 총점
21-Items Hamilton Depression Rating Scale (21-items HAM-D)	방문명, 방문일, 21-items HAM-D 하위 항목 점수 및 총점
Beck's Scale for Suicidal Ideation (BSSI)	방문명, 방문일, BSSI 하위 항목 점수 및 총점
Generalized Anxiety Disorder-7(GAD-7)	방문명, 방문일, GAD-7 하위 항목 점수 및 총점
한국판 Barratt Impulsiveness Scale-11-Revised (K-BIS-11-R)	방문명, 방문일, K-BIS-11-R 하위 항목 점수 및 총점
한국판 UCLA 외로움 척도 (3판)	방문명, 방문일, UCLA 외로움 척도 하위 항목 점수 및 총점
EQ-5D-3L, 오늘의 건강상태	방문명, 방문일, EQ-5D-3L 하위 항목 점수, 오늘의 건강상태 VAS 점수
CSRI (Client Service Receipt Inventory)	방문명, 방문일, 서비스 유형과 해당 서비스 이용 횟수, 정신건강복지센터 이용 여부, 지역사회기반 서비스 이용 여부, 건강식품 복용여부 및 정보, 병원 방문 소요 시간 및 금액, 동거인, 반려동물 양육 비용, 일상생활에 도움을 준 사람
치료 지속 여부	치료순응도, 생활사건, 자살시도
방문3_집중사례관리서비스	상담 횟수 및 소요 시간, 집중사례관리서비스 환자 만족도
방문4_집중사례관리서비스	상담 횟수 및 소요 시간, 집중사례관리서비스 환자 만족도
방문5_집중사례관리서비스	상담 횟수 및 소요 시간, 집중사례관리서비스 환자 만족도
방문6_집중사례관리서비스	상담 횟수 및 소요 시간, 집중사례관리서비스 환자 만족도
병용약물	약물명, 투여경로, 1일 투여량, 투여 시작일 및 종료일, 지속 여부, 중지 사유
연구중단, 종결	연구 종결일, 중단 사유 발생일, 중도 탈락 사유

3. 데이터 정제

(1) 논리적 오류 및 이상치 처리

PACEN 임상연구 데이터는 논리적 오류 및 이상치 처리를 위해 웹기반 임상연구관리시스템 (iCReaT) 내 전자증례기록지(e-CRF) 구축 시 자료검증방안(Data Validation Specification, DVS)을 설정하였습니다. 1차 시스템 쿼리, 2차 매뉴얼 쿼리를 통해 자료 입력 시 오류를 최소화하고 입력된 데이터 값의 오류 확인 및 데이터 정제를 시행하였습니다

쿼리 종류	항목
1차 오류 감지 - 시스템 쿼리(System query)	1. 연구대상자 ID 중복여부 확인 2. 필수 입력항목 확인 3. 자동계산식 및 조건식 설정 4. 자료 입력허용 범위 확인 및 설정
2차 오류 감지 - 매뉴얼 쿼리(Manual query)	수집된 데이터 중 입력값이 불충분하거나 그 외 연구 site에서 직접 내용 확인이 필요한 경우 (더웨이 헬스케어 Data Management 계획에 따른 매뉴얼 쿼리 발행)
의학적 코딩	병력, 약물, 이상사례에 대해 표준화된 용어로 분류 1. 병력 분류기준 - MedDRA version 26.1 - Preferred Term과 System Organ Class를 우선으로 표준화 2. 약물 - 대한민국 의학정보센터, 약학 정보원의 ATC(Index 2024) 분류 활용하여 Level 1과 Level 2로 분류 3. 이상사례 - MedDRA version 26.1 - Preferred Term과 System Organ Class를 우선으로 표준화

(2) 결측치 처리

중도탈락 및 데이터 절단 시점 내 종료방문 예정이 미포함되어있는 대상자의 데이터 또는 기타 결측치는 다음과 같이 처리하였습니다. 결측치 처리에 대한 코딩값은 'III-3. 변수 설명서'에서도 확인이 가능합니다.

○ 항목 무응답:

1) Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) 자살 심각도 하위 척도

변수명	변수설명	코딩값
CS1 / CS1_1	1. [죽고 싶은 소망] 죽고 싶거나 잠든 뒤 깨어나지 않았으면 좋겠다고 바란 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 = 1, <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 = 2
CS2 / CS2_1	2. [비특이성 적극적 자살 생각] 실제로 자살을 생각해본 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 = 1, <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 = 2
CSS1 / CSS1_1	[빈도] 평소에 이런 생각을 몇 번이나 하셨습니까?	blank → '0'으로 코딩
CSS2 / CSS1_2	[지속 시간] 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니까?	blank → '0'으로 코딩
CSS3 / CSS1_3	[통제 가능성] 자신이 원할 경우 자살하거나 죽고 싶다는 생각을 중단할 수 있었습니까/있습니까?	blank → '0'으로 코딩
CSS4 / CSS1_4	[저지 요인] 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가 (예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있습니까?	blank → '0'으로 코딩
CSS5 / CSS1_5	[자살 생각의 이유] 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나 어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까?	blank → '0'으로 코딩

※ 자살생각(죽고 싶은 소망, 자살생각-비특이성 적극적 자살생각)에 아니오로 응답한 경우
→ 자살생각의 심각성 하위 분류(빈도, 지속 시간, 통제 가능성, 저지 요인, 자살 생각의 이유) 값에 결측이 있으면 '0'으로 대체

2) Beck's Suicide Intent Scale (SIS)

변수명	변수설명	코딩값
SISND	자살 시도 여부	<input checked="" type="checkbox"/> Not Determined (ND) = 1
SISND	총점	blank → '0'으로 코딩

※ 자살시도를 하지 않은 대상자의 경우 ND를 선택하여 해당 척도를 시행하지 않은 경우
→ 총점을 '0'으로 대체

(3) 비식별화 자료 정제 과정

- 가명처리 후 제공 예정

4. 표본 유지율 및 대상자 특성

※ 분석 포함 대상자 수는 원데이터에 대한 가명 처리 후 일부 변경될 수 있음

(1) 추적조사 추적률

기저시점	추적률 (%)				
VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
322명	314명(100.0%)	286명(91.0%)	277명(88.2%)	264명(84.0%)	245명(78.0%)

(2) 기저시점 기준 등록 대상자 특성

(단위: 명,%)

인구학적 정보	시험군 (N=158)	대조군 (N=156)	Total (N=314)
성별			
남성	58(36.71)	49(31.41)	107(34.08)
여성	100(63.29)	107(68.59)	207(65.92)
나이			
Mean±SD	32.24±13.28	31.50±13.07	31.87±13.16
Median	27.00	27.00	27.00
Min, Max	18.00, 75.00	18.00, 79.00	18.00, 79.00
혼인상태			
미혼	109(68.99)	109(69.87)	218(69.43)
기혼	25(15.82)	28(17.95)	53(16.88)
동거	1(0.63)	2(1.28)	3(0.96)
별거	4(2.53)	2(1.28)	6(1.91)
이혼	17(10.76)	10(6.41)	27(8.60)
사별	1(0.63)	5(3.21)	6(1.91)
기타	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)
학력			
0년	0(0.00)	2(1.28)	2(0.64)
1년	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)
2년	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)

인구학적 정보	시험군 (N=158)	대조군 (N=156)	Total (N=314)
3 년	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)
4 년	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)
5 년	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)
6 년(초졸)	5(3.16)	1(0.64)	6(1.91)
7 년	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)
8 년	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)
9 년(중졸)	6(3.80)	4(2.56)	10(3.18)
10 년	1(0.63)	0(0.00)	1(0.32)
11 년	2(1.27)	2(1.28)	4(1.27)
12 년(고졸)	51(32.28)	38(24.36)	89(28.34)
13 년	12(7.59)	25(16.03)	37(11.78)
14 년	19(12.03)	21(13.46)	40(12.74)
15 년	14(8.86)	12(7.69)	26(8.28)
16 년(대졸)	40(25.32)	46(29.49)	86(27.39)
17 년	0(0.00)	2(1.28)	2(0.64)
18 년(석사)	6(3.80)	2(1.28)	8(2.55)
19 년	0(0.00)	1(0.64)	1(0.32)
20 년(박사)	1(0.63)	0(0.00)	1(0.32)
종교			
없음	104(65.82)	112(71.79)	216(68.79)
있음	53(33.54)	44(28.21)	97(30.89)
의료보장			
지역건강보험	55(34.81)	54(34.62)	109(34.71)
직장건강보험	79(50.00)	87(55.77)	166(52.87)
의료급여 1 종	16(10.13)	6(3.85)	22(7.01)
의료급여 2 종	2(1.27)	5(3.21)	7(2.23)
기타	5(3.16)	4(2.56)	9(2.87)
직업			
무직	52(32.91)	44(28.21)	96(30.57)
학생	40(25.32)	50(32.05)	90(28.66)
주부	14(8.86)	17(10.90)	31(9.87)

인구학적 정보		시험군 (N=158)	대조군 (N=156)	Total (N=314)
전문직		7(4.43)	6(3.85)	13(4.14)
사무직		10(6.33)	10(6.41)	20(6.37)
서비스직		14(8.86)	11(7.05)	25(7.96)
판매직		2(1.27)	2(1.28)	4(1.27)
농어민		0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)
군인		0(0.00)	1(0.64)	1(0.32)
단순노무직		1(0.63)	2(1.28)	3(0.96)
기술직		4(2.53)	3(1.92)	7(2.23)
기타		13(8.23)	10(6.41)	23(7.32)
월평균소득				
50 만원이하		67(42.41)	63(40.38)	130(41.40)
51-100 만원		26(16.46)	27(17.31)	53(16.88)
101-150 만원		10(6.33)	12(7.69)	22(7.01)
151-200 만원		13(8.23)	17(10.90)	30(9.55)
201-250 만원		14(8.86)	6(3.85)	20(6.37)
251-300 만원		10(6.33)	10(6.41)	20(6.37)
301 만원이상		17(10.76)	21(13.46)	38(12.10)
신 체 병 력	유무			
	유	71(44.94)	63(40.38)	134(42.68)
	무	86(54.43)	93(59.62)	179(57.01)
	현재 지속여부			
	예	69(43.67)	58(37.18)	127(40.45)
	아니오	2(1.27)	5(3.21)	7(2.23)
	중증도			
	경증	36(22.78)	28(17.95)	64(20.38)
중증등	30(18.99)	29(18.59)	59(18.79)	
중등	5(3.16)	6(3.85)	11(3.50)	
음 주 력	평소 음주 여부			
	예	90(56.96)	91(58.33)	181(57.64)
	아니오	67(42.41)	65(41.67)	132(42.04)
	음주 횟수			

인구학적 정보		시험군 (N=158)	대조군 (N=156)	Total (N=314)
한달에 한번 미만 월 2-4 회 주 2-3 회 주 4 회이상 1회 음주량 1-2 잔 3-4 잔 5-6 잔 7-9 잔 10 잔이상	한달에 한번 미만	22(13.92)	22(14.10)	44(14.01)
	월 2-4 회	37(23.42)	36(23.08)	73(23.25)
	주 2-3 회	22(13.92)	17(10.90)	39(12.42)
	주 4 회이상	9(5.70)	16(10.26)	25(7.96)
	1회 음주량			
	1-2 잔	15(9.49)	21(13.46)	36(11.46)
	3-4 잔	14(8.86)	15(9.62)	29(9.24)
	5-6 잔	6(3.80)	11(7.05)	17(5.41)
	7-9 잔	18(11.39)	19(12.18)	37(11.78)
	10 잔이상	37(23.42)	25(16.03)	62(19.75)
우울증으로 인한 입원				
예	34(21.52)	31(19.87)	65(20.70)	
아니오	124(78.48)	125(80.13)	249(79.30)	
우울증 관련 정신과 치료				
현재 치료 중	156(98.73)	155(99.36)	311(99.04)	
치료받지않음	1(0.63)	0(0.00)	1(0.32)	
치료 중단	1(0.63)	1(0.64)	2(0.64)	
우울증 관련 투여 약물 유무 (최근3개월이내)				
예	152(96.20)	149(95.51)	301(95.86)	
아니오	6(3.80)	7(4.49)	13(4.14)	
자살 가족력 유무				
예	30(18.99)	25(16.03)	55(17.52)	
아니오	128(81.01)	131(83.97)	259(82.48)	

5. 주요변수 통계표

(1) 컬럼비아 자살 심각도 평가 척도(C-SSRS) 총점 변화량

C-SSRS 총점 변화량의 평균은 Baseline(방문1) 대비 방문3 시점에서 시험군(-7.59±7.29 점)이 대조군(-5.71±7.75점) 보다 더 감소하였고(p=0.0072) 방문4 시점에서 시험군(-9.23 ±8.43점)이 대조군(-6.75±6.93점) 보다 더 감소하였으며(p=0.0343), 방문6 시점에서 시험군(-9.17±7.90점)이 대조군(-7.46±8.63점) 보다 더 감소하였습니다(p=0.0432). 시험군 및 대조군의 군내 차이는 모두 통계적으로 유의하게 감소하였으며(p<0.001), Repeated Measure ANOVA 결과 시간이 지남에 따라 C-SSRS 총점의 평균은 통계적으로 유의한 감소를 보였습니다(p<0.0001).

	시험군	대조군	군간 p-value
Visit 1			
Mean±SD	21.42±4.06	20.81±3.48	
Median	21.50	21.00	0.1352**
Min, Max	0.00, 30.00	9.00, 29.00	
Visit 2			
Mean±SD	15.87±7.27	15.99±7.33	
Median	18.00	17.00	0.9432**
Min, Max	0.00, 27.00	0.00, 29.00	
Difference(Visit 2) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-5.55±7.40	-4.82±6.97	
Median	-4.00	-3.00	0.2129**
Min, Max	-28.00, 20.00	-25.00, 9.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Visit 3			
Mean±SD	13.83±7.86	15.10±7.96	
Median	16.00	17.00	0.1229**
Min, Max	0.00, 28.00	0.00, 30.00	
Difference(Visit 3) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-7.59±7.29	-5.71±7.75	
Median	-5.00	-3.00	0.0072**
Min, Max	-25.00, 9.00	-25.00, 6.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Visit 4			
Mean±SD	12.21±8.49	14.06±7.46	
Median	15.00	16.00	0.2174**
Min, Max	0.00, 26.00	0.00, 30.00	
Difference(Visit 4) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-9.23±8.43	-6.75±6.93	
Median	-7.00	-5.00	0.0343**
Min, Max	-28.00, 5.00	-25.00, 6.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	

	시험군	대조군	군간 p-value
Visit 5			
Mean±SD	11.73±8.59	12.55±8.62	0.3144**
Median	14.00	15.00	
Min, Max	0.00, 28.00	0.00, 27.00	
Difference(Visit 5) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-9.72±8.86	-8.25±8.23	0.1242**
Median	-7.00	-6.00	
Min, Max	-28.00, 6.00	-25.00, 7.00	
p-value**	0.0001††	<.0001††	
Visit 6			
Mean±SD	12.24±8.43	13.36±8.68	0.2004**
Median	15.00	16.00	
Min, Max	0.00, 26.00	0.00, 26.00	
Difference(Visit 6) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-9.17±7.90	-7.46±8.63	0.0432**
Median	-7.00	-4.50	
Min, Max	-26.00, 6.00	-29.00, 5.00	
p-value**	0.0004†	<.0001††	
Repeated Measure ANOVA P-VALUE	Group	Time	Group*Time
	0.2683	<.0001	0.1745

** Mann whitney U test

††Wilcoxon signed rank test

(2) 컬럼비아 자살 심각도 평가 척도(C-SSRS) 자살생각 변화(죽고 싶은 소망)

방문4 시점에서 죽고 싶은 소망이 있다고 대답한 비율이 시험군(71.21% (94/132명))이 대조군(84.21% (96/114명))보다 낮게 나타났습니다($p=0.0153$). Repeated Measure ANOVA 결과 시간이 지남에 따라 죽고 싶은 소망의 비율이 통계적으로 유의한 감소를 보였습니다($p < 0.0001$).

		시험군	대조군	군간 p-value
Visit 1	예	131(99.24)	114(100.00)	1.0000**
	아니오	1(0.76)	0(0.00)	
Visit 2	예	113(85.61)	99(86.84)	0.7794*
	아니오	19(14.39)	15(13.16)	
Visit 3	예	113(85.61)	99(86.84)	0.6658*
	아니오	19(14.39)	15(13.16)	
Visit 4	예	94(71.21)	96(84.21)	0.0153*
	아니오	38(28.79)	18(15.79)	
Visit 5	예	91(68.94)	82(71.93)	0.6087*
	아니오	41(31.06)	32(28.07)	
Visit 6	예	95(71.97)	85(74.56)	0.6473*
	아니오	37(28.03)	29(25.44)	
Repeated Measure ANOVA with binary data, P-VALUE		Group	Time	Group*Time
		0.2456	<.0001	0.2322

(3) 컬럼비아 자살 심각도 평가 척도(C-SSRS) 자살생각 변화량(가장 심각한 자살 생각)

시험군 및 대조군간의 차이는 없었으나($p>0.05$), 군내 차이는 모두 통계적으로 유의하게 감소하였으며($p<0.0001$), Repeated Measure ANOVA 결과 시간이 지남에 따라 가장 심각한 자살 생각에 대한 점수는 통계적으로 유의하게 감소하는 것으로 나타났습니다($p<0.0001$).

	시험군	대조군	군간 p-value
Visit 1			
Mean±SD	4.11±1.17	4.28±1.08	
Median	5.00	5.00	0.1762**
Min, Max	0.00, 5.00	1.00, 5.00	
Visit 2			
Mean±SD	2.24±1.58	2.45±1.66	
Median	2.00	2.00	0.3460**
Min, Max	0.00, 5.00	0.00, 5.00	
Difference(Visit 2) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-1.86±1.70	-1.83±1.62	
Median	-2.00	-2.00	0.6688**
Min, Max	-5.00, 4.00	-5.00, 1.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Visit 3			
Mean±SD	2.02±1.58	2.26±1.65	
Median	2.00	2.00	0.2643**
Min, Max	0.00, 5.00	0.00, 5.00	
Difference(Visit 3) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-2.08±1.60	-2.02±1.72	
Median	-2.00	-2.00	0.7191**
Min, Max	-5.00, 2.00	-5.00, 1.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Visit 4			
Mean±SD	1.78±1.68	2.01±1.55	
Median	1.00	2.00	0.1322**
Min, Max	0.00, 5.00	0.00, 5.00	
Difference(Visit 4) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-2.34±1.85	-2.27±1.64	
Median	-2.00	-2.00	0.6529**
Min, Max	-5.00, 2.00	-5.00, 1.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Visit 5			
Mean±SD	1.69±1.60	1.87±1.67	
Median	1.00	1.00	0.4106**
Min, Max	0.00, 5.00	0.00, 5.00	
Difference(Visit 5) -			

베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-2.43±1.90	-2.41±1.92	0.8426**
Median	-2.00	-3.00	
Min, Max	-5.00, 4.00	-5.00, 2.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Visit 6			
Mean±SD	1.82±1.61	2.14±1.75	0.1695**
Median	1.00	2.00	
Min, Max	0.00, 5.00	0.00, 5.00	
Difference(Visit 6) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-2.29±1.83	-2.15±1.80	0.4597**
Median	-2.00	-2.00	
Min, Max	-5.00, 3.00	-5.00, 1.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Repeated Measure ANOVA P-VALUE	Group	Time	Group*Time
	0.1039	<.0001	0.9850

** Mann whitney U test

††Wilcoxon signed rank test

(4) 컬럼비아 자살 심각도 평가 척도(C-SSRS) 자살생각 변화량(자살 생각의 강도)

Baseline(방문1) 대비 방문3 시점에서 시험군(-5.51±6.29점)이 대조군(-3.69±6.64점)보다 더 감소하였고(p=0.0040) 방문4 시점에서 시험군(-6.89±7.21점)이 대조군(-4.47±5.95점)보다 더 감소하였으며(p=0.0125), 방문6 시점에서 시험군(-6.89±6.61점)이 대조군(-5.30±7.31점)보다 더 감소하였습니다(p=0.0285). 시험군 및 대조군의 군내 차이는 모두 통계적으로 유의하게 감소하였으며(p<0.0001), Repeated Measure ANOVA 결과 시간이 지남에 따라 자살 생각의 강도의 감소가 통계적으로 유의하게 나타났습니다(p<0.0001).

	시험군	대조군	군간 p-value
Visit 1			
Mean±SD	17.31±3.43	16.53±3.07	0.0343**
Median	17.00	16.00	
Min, Max	0.00, 25.00	8.00, 24.00	
Visit 2			
Mean±SD	13.63±6.20	13.54±6.16	0.6821**
Median	15.00	15.00	
Min, Max	0.00, 23.00	0.00, 24.00	
Difference(Visit 2) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-3.68±6.51	-2.98±6.05	0.2892**
Median	-2.00	-1.50	
Min, Max	-23.00, 16.00	-20.00, 9.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	

Visit 3			
Mean±SD	11.80±6.58	12.83±6.68	0.1168**
Median	13.50	14.00	
Min, Max	0.00, 23.00	0.00, 25.00	
Difference(Visit 3) - 베이스라인(Visit 1)			0.0040**
Mean±SD	-5.51±6.29	-3.69±6.64	
Median	-4.00	-2.00	
Min, Max	-20.00, 7.00	-21.00, 8.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Visit 4			0.1925**
Mean±SD	10.44±7.23	12.05±6.33	
Median	13.00	14.00	
Min, Max	0.00, 23.00	0.00, 25.00	0.0125**
Difference(Visit 4) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-6.89±7.21	-4.47±5.95	
Median	-4.00	-3.00	
Min, Max	-23.00, 6.00	-21.00, 6.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Visit 5			0.3198**
Mean±SD	10.04±7.24	10.68±7.24	
Median	12.00	13.00	
Min, Max	0.00, 23.00	0.00, 23.00	0.0931**
Difference(Visit 5) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-7.29±7.43	-5.84±6.91	
Median	-5.00	-4.00	
Min, Max	-23.00, 6.00	-21.00, 7.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Visit 6			0.2744**
Mean±SD	10.42±7.09	11.24±7.26	
Median	13.00	14.00	
Min, Max	0.00, 22.00	0.00, 23.00	0.0285**
Difference(Visit 6) - 베이스라인(Visit 1)			
Mean±SD	-6.89±6.61	-5.30±7.31	
Median	-5.00	-3.00	
Min, Max	-21.00, 7.00	-24.00, 6.00	
p-value**	<.0001††	<.0001††	
Repeated Measure ANOVA P-VALUE	Group	Time	Group*Time
	0.3477	<.0001	0.0823

** Mann whitney U test

††Wilcoxon signed rank test

(5) 컬럼비아 자살 심각도 평가 척도(C-SSRS) 자살행동 변화량

방문1 시점의 실제적기도- 총 기도수는 시험군 2.41±2.60회, 대조군 2.80±6.67회로 나타났고, 총 방해된 기도수는 시험군 0.48±1.23회, 대조군 0.80±2.21회로 나타났으며, 총 중단된 기도수는 시험군 1.87±8.77회, 대조군 0.96±2.80회로 나타났습니다. 이후 방문6 시점에서 실제적기도- 총 기도수는 시험군 0.10±0.37회, 대조군 0.19±0.65회로 나타났고 총 방해된 기도수는 시험군 0.01±0.09회, 대조군 0.07±0.37회로 나타났으며, 총 중단된 기도수는 시험군 0.06±0.30회, 대조군 0.09±0.52회로 나타났습니다. 자살 행동 변화량의 모든 방문과 항목에서 시험군과 대조군 간에 통계적으로 유의한 차이는 없었습니다(p>0.05).

		시험군	대조군	군간 p-value
Visit 1				
실제적기도- 총기도수	Mean±SD	2.41±2.60	2.80±6.67	0.2955**
	Median	2.00	1.00	
	Min, Max	0.00, 15.00	0.00, 66.00	
총 방해된 기도수	Mean±SD	0.48±1.23	0.80±2.21	0.2831**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 10.00	0.00, 15.00	
총 중단된 기도수	Mean±SD	1.87±8.77	0.96±2.80	0.2021**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 99.00	0.00, 20.00	
Visit 2				
실제적기도- 총기도수	Mean±SD	0.06±0.30	0.09±0.34	0.4114**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 2.00	0.00, 2.00	
총 방해된 기도수	Mean±SD	0.05±0.44	0.04±0.23	0.5442**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 5.00	0.00, 2.00	
총 중단된 기도수	Mean±SD	0.08±0.49	0.08±0.38	0.5844**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 5.00	0.00, 3.00	
Visit 3				
실제적기도- 총기도수	Mean±SD	0.09±0.31	0.04±0.18	0.1141**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 2.00	0.00, 1.00	
총 방해된 기도수	Mean±SD	0.02±0.12	0.02±0.13	0.8859**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 1.00	0.00, 1.00	
총 중단된 기도수	Mean±SD	0.01±0.09	0.09±0.76	0.2475**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 1.00	0.00, 8.00	
Visit 4				
실제적기도- 총기도수	Mean±SD	0.11±0.41	0.04±0.31	0.0863**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 3.00	0.00, 3.00	

총 방해된 기도수	Mean±SD	0.04±0.31	0.02±0.19	0.6501**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 3.00	0.00, 2.00	
총 중단된 기도수	Mean±SD	0.07±0.35	0.02±0.13	0.2162**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 3.00	0.00, 1.00	
Visit 5				
실제적기도- 총기도수	Mean±SD	0.02±0.15	0.06±0.28	0.2118**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 1.00	0.00, 2.00	
총 방해된 기도수	Mean±SD	0.01±0.09	0.04±0.28	0.2458**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 1.00	0.00, 2.00	
총 중단된 기도수	Mean±SD	0.02±0.12	0.03±0.16	0.5393**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 1.00	0.00, 1.00	
Visit 6				
실제적기도- 총기도수	Mean±SD	0.10±0.37	0.19±0.65	0.5044**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 2.00	0.00, 3.00	
총 방해된 기도수	Mean±SD	0.01±0.09	0.07±0.37	0.0659**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 1.00	0.00, 3.00	
총 중단된 기도수	Mean±SD	0.06±0.30	0.09±0.52	0.9620**
	Median	0.00	0.00	
	Min, Max	0.00, 2.00	0.00, 5.00	


** Mann whitney U test

(6) 자살 재시도 비율 및 누적 발생 비율

시험군에서 방문2는 4.55% (6/132명) - 방문7은 26.52% (35/132명), 대조군에서 방문2는 5.26% (6/114명) - 방문7은 25.44% (29/114명)로 나타났으며, 시험군과 대조군의 차이는 통계적으로 유의하지 않았습니다(p=0.8565).

		시험군		대조군		p-value
		누적발생 대상자의수	누적발생 비율(%)	누적발생 대상자의수	누적발생 비율(%)	
자살 재시도	Visit 2	6	4.55	6	5.26	0.8565*
	Visit 3	14	10.61	12	10.53	
	Visit 4	22	16.67	16	14.04	
	Visit 5	24	18.18	19	16.67	
	Visit 6	29	21.97	26	22.81	

* Log-rank test



< Kaplan-Meier Curve for Suicide events per group >

III. 변수 설명서

1. 변수 상세 설명

※ 도메인별 공통 변수: 대상자번호(SUBJNO), 방문명(VISITNM), 방문일(VISITDT)

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
환자선정방문	공통 변수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		SEX_SYS_VAL	성별	1=Male 2=Female	Integer	
		BIRTHDT_SYS_VAL	생년월일	YYYY-MM-DD	Date	
		VISITNM	방문명	방문1=Screening	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	환자선정방문	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	1	VISIT1	환자선정방문 자료 수집일	YYYY-MM-DD	Date	
	2	IN1	선정기준 1. 만 18세 이상의 성인 남녀	1=예 2=아니오	Integer	
	3	IN2	선정기준 2. 연구 등록 1개월 내에 자살의도를 가진 자살사고 또는 2개월 내에 자살을 시도한 병력이 있으며 주요 우울증의 진단 및 통계 편람 (제 5판) (DSM-5) 진단 기준을 충족하고,	1=예 2=아니오	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			임상 평가를 토대로 간이 국제 신경정신과 면담 (MINI)에 의해 확인된 정신병적 소견이 없는 자			
	4	IN3	선정기준 3. 연구 참여를 스스로 결정할 수 있는 동의 능력이 있는 자	1=예 2=아니오	Integer	
	5	EX1	제외기준 1. 등록시점에서 시험대상자의 긴박한 자살 위험으로 인해 급성 정신과 입원이 임상적으로 필요한 경우로 의사가 판단한 경우	1=예 2=아니오	Integer	
	6	EX2	제외기준 2. 현재 경계성 인격 장애 등 DSM-5 기준에 따른 2축 진단기준을 충족하는 경우	1=예 2=아니오	Integer	
	7	EX3	제외기준 3. 자폐증, 치매, 또는 지적 장애의 현재 임상적 진단이 있는 경우	1=예 2=아니오	Integer	
	8	EX4	제외기준 4. 니코틴 또는 카페인을 제외하고, 스크리닝 전 6개월 이내에	1=예 2=아니오	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			DSM-5 기준에 따라 중증등 내지 중증의 물질 또는 알코올 사용 장애의 과거력이 있는 경우			
	9	EX5	제외기준 5. 기타 연구자가 연구 참여에 부적합하다고 판단한 경우	1=예 2=아니오	Integer	
피험자 기초정보	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문1=Screening	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	피험자기초정보	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
		10	SD1	혼인상태	1=미혼 2=기혼 3=동거 4=별거 5=이혼 6=사별 7=기타	Integer
	11	SD3F	부	1=생존 2=사망	Integer	
	12	SD3M	모	1=생존 2=사망	Integer	
	13	SD3BS	형제자매		String	
	14	SD3K	자녀		String	
	15	SD4	학력		Integer	
16	SD5	종교	1=없음 2=있음	Integer		

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	17	SD6	의료보장	1=지역건강보험 2=직장건강보험 3=의료급여 1종 4=의료급여 2종 5=기타	Integer	
	18	SD7	직업	1=무직 2=학생 3=주부 4=전문직 5=사무직 6=서비스직 7=판매직 8=농어민 9=군인 10=단순노무직 11=기술직 12=기타	Integer	
	19	SD8	월평균소득	1=50만원 이하 2=51-100만원 3=101-150만원 4=151-200만원 5=201-250만원 6=251-300만원 7=301만원 이상	Integer	
	20	SD9YN	신체병력_유무	1=유 2=무	Integer	
	21	SD9YN_NM	신체병력_질병명			
	22	SD9YN_NM_ _MEDDRA_V ER	MedDRA_Version	26.1	String	
	23	SD9YN_NM_ _LLT_CODE	MedDRA_Lowest Level Term Code	MedDRA_Lowest Level Term Code	String	
	24	SD9YN_NM_ _LLT_NAME	MedDRA_Lowest Level Term	MedDRA_Lowest Level Term	String	
	25	SD9YN_NM_ _PT_CODE	MedDRA_Preferr ed Term Code	MedDRA_Preferred Term Code	String	
	26	SD9YN_NM_ _PT_NAME	MedDRA_Preferr ed Term	MedDRA_Preferred Term	String	
	27	SD9YN_NM_ _HLT_CODE	MedDRA_High Level Term Code	MedDRA_High Level Term Code	String	
	28	SD9YN_NM_ _HLT_NAME	MedDRA_High Level Term	MedDRA_High Level Term	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	29	SD9YN_NM_HLGT_CODE	MedDRA_High Level Group Term Code	MedDRA_High Level Group Term Code	String	
	30	SD9YN_NM_HLGT_NAME	MedDRA_High Level Group Term	MedDRA_High Level Group Term	String	
	31	SD9YN_NM_SOC_CODE	MedDRA_System Organ Class Code	MedDRA_System Organ Class Code	String	
	32	SD9YN_NM_SOC_NAME	MedDRA_System Organ Class	MedDRA_System Organ Class	String	
	33	SD9YN_ING	신체병력_현재 지속 여부	1=예 2=아니오	Integer	
	34	SD9YN_SEV	신체병력_중증도	1=경증 2=중등증 3=중증	Integer	
	35	SD10YN	평소 음주여부	1=예 2=아니오	Integer	
	36	SD11CNT	음주 횟수	1=한달에 한번 미만 2=월 2-4회 3=주 2-3회 4=주 4회 이상	Integer	
	37	SD11VL	1회 음주량	1=1-2잔 2=3-4잔 3=5-6잔 4=7-9잔 5=10잔 이상	Integer	
	38	SD2_1	동거인_없음	1=없음	Integer	
	39	SD2_2	동거인_배우자	1=배우자	Integer	
	40	SD2_3	동거인_자녀	1=자녀	Integer	
	41	SD2_4	동거인_부	1=부	Integer	
	42	SD2_5	동거인_모	1=모	Integer	
	43	SD2_6	동거인_조부	1=조부	Integer	
	44	SD2_7	동거인_조모	1=조모	Integer	
	45	SD2_8	동거인_친구/동료	1=친구/동료	Integer	
	46	SD2_9	동거인_기타	1=기타	Integer	
현재 우울증 발현에 대한 병력	공통 변수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공		
		VISITNM	방문명	방문1=Screening	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	현재 우울증 발현에 대한 병력	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	47	DPSDT	현재의 에피소드가 시작된 날짜	YYYY-MM-DD	Date	
	48	DPADYN	현재의 에피소드로 인해 입원을 하하셨습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	49	DPSEYN	현재의 에피소드가 있기 전 확인 가능한 스트레스가 될 만한 안 좋은 생활 사건이 있었나요?	1=예 2=아니오	Integer	
	50	DPSEY_ETC	'예' 인 경우, 그 내용을 적으시오.		String	
	51	DPSEE	그 생활사건이 환자의 생활에 얼마나 큰 영향을 주었습니까? (직접 물어볼 것)	1=전혀 영향 없었음 2=약간 영향 3=중등도 영향 4=심각한 영향	Integer	
	52	DPTM	현재의 에피소드에 대한 정신과 치료	1=현재 치료중 2=치료받지 않음 3=치료 중단	Integer	
	53	DPTMYN	현재의 에피소드에 대해 투여된 약물이 있습니까?(최근 3개월 이내)	1=예 2=아니오	Integer	
	54	DPTMNM	약물명(성분명)		String	
	55	DPTMNM_ 대표코드	대표코드	대표코드		
	56	DPTMNM_ 업체명	업체명	업체명		
	57	DPTMNM_A	ATC_Code	ATC_Code		

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이	
	58	TC_CODE DPTMNM_E	ATC_Name	약물명(성분명)	String		
	59	DPTMRT	투여경로	1=per oral(PO) 2=Intravenous(IV) 3=Intramuscular(IM) 4=Subcutaneous(SC) 5=Sublingual(SL) 6=기타	Integer		
	60	DPTMDO	1일 투여량		String		
	61	DPTMST	투여기간_시작일	YYYY-MM-DD	Date		
	62	DPTMEN	투여기간_종료일	YYYY-MM-DD	Date		
	63	DPTMING	투여기간_지속여 부	1=투여 지속 중	Integer		
	64	DPTMSTOP	중지사유	1=효과 결여 2=복약순응도 결여 3=내약성 결여 4=치료 완료 5=기타	Integer		
	가족력	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
			SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
			ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
VISITNM			방문명	방문1=Screening	String		
VISITDT			방문일	YYYY-MM-DD	Date		
CRFNM			도메인명	가족력	String		
CRFSTAT			CRF상태	LOCK	String		
65			FHSYN	자살 가족력이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
66			FHS_Y_GF	'예'인 경우 가족관계 조부	1=조부	Integer	
67			FHS_Y_GM	'예'인 경우 가족관계 조모	1=조모	Integer	
68			FHS_Y_F	'예'인 경우 가족관계 부	1=부	Integer	
69			FHS_Y_M	'예'인 경우 가족관계 모	1=모	Integer	
70			FHS_Y_BS	'예'인 경우	1=형제자매	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			가족관계_형제자 매			
	71	FHS_Y_ETC	'예'인 경우 가족관계_방계(삼 촌, 이모 등)	1=방계(삼촌, 이모 등)	Integer	
	72	FHDPYN	우울증 가족력이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	73	FHDPYN_Y_G F	'예'인 경우 가족관계_조부	1=조부	Integer	
	74	FHDPYN_Y_G M	'예'인 경우 가족관계_조모	1=조모	Integer	
	75	FHDPYN_Y_F	'예'인 경우 가족관계_부	1=부	Integer	
	76	FHDPYN_Y_ M	'예'인 경우 가족관계_모	1=모	Integer	
	77	FHDPYN_Y_B S	'예'인 경우 가족관계_형제자 매	1=형제자매	Integer	
	78	FHDPYN_Y_E TC	'예'인 경우 가족관계_방계(삼 촌, 이모 등) 우울증이 아닌	1=방계(삼촌, 이모 등)	Integer	
	79	FHOTHYN	다른 정신과 질환의 가족력이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	80	FHOTHYN_Y	'예'인 경우 가족관계	1=조부 2=조모 3=부 4=모 5=형제, 자매 6=방계(삼촌, 이모 등)	Integer	
	81	FHOTHYN_Y_ NM	'예'인 경우 질환명		String	
	82	FHOTHYN_Y_ NM_MEDDR A_VER	MedDRA_Version	26.1	String	
	83	FHOTHYN_Y_ NM_LLT_CO DE	MedDRA_Lowest Level Term Code	MedDRA_Lowest Level Term Code	String	
	84	FHOTHYN_Y_ NM_LLT_NA ME	MedDRA_Lowest Level Term	MedDRA_Lowest Level Term	String	
	85	FHOTHYN_Y_ NM_PT_CO	MedDRA_Preferr ed Term Code	MedDRA_PREFERRED Term Code	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		DE				
	86	FHOTHYN_Y_NM_PT_NA ME	MedDRA_Preferred Term	MedDRA_Preferred Term	String	
	87	FHOTHYN_Y_NM_HLT_C ODE	MedDRA_High Level Term Code	MedDRA_High Level Term Code	String	
	88	FHOTHYN_Y_NM_HLT_N AME	MedDRA_High Level Term	MedDRA_High Level Term	String	
	89	FHOTHYN_Y_NM_HLGT_C ODE	MedDRA_High Level Group Term Code	MedDRA_High Level Group Term Code	String	
	90	FHOTHYN_Y_NM_HLGT_NAME	MedDRA_High Level Group Term	MedDRA_High Level Group Term	String	
	91	FHOTHYN_Y_NM_SOC_C ODE	MedDRA_System Organ Class Code	MedDRA_System Organ Class Code	String	
	92	FHOTHYN_Y_NM_SOC_N AME	MedDRA_System Organ Class	MedDRA_System Organ Class	String	
우울증 및 자살 시도 과거력	공통 변수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문1=Screening	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	우울증 및 자살 시도 과거력	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
		93	PHDYN	과거에 우울증 에피소드가 있었습니까?	1=예 2=아니오	Integer
	94	PHDYN_YDT	'예'인 경우 첫 번째 에피소드 발생 시기	YYYY-MM-DD	Date	
	95	PHDYN_YCT	과거 총		Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이	
			에피소드 횟수(현재 것 제외)				
	96	PHDHPYN	과거의 에피소드 발현 시 입원을 한 적이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer		
	97	PHDHPYN_Y CT	'예'인 경우 입원 횟수		Integer		
	98	PHDSAYN	과거 자살 시도력이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer		
	99	PHDSAYN_Y	'예'인 경우 시도 횟수(2개월 내 자살시도력 포함)		Integer		
	최근(2개월 이내) 자살시도에 관한 병력	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
			SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
			ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
			VISITNM	방문명	방문1=Screening	String	
VISITDT			방문일	YYYY-MM-DD	Date		
CRFNM			도메인명	최근(2개월 이내) 자살시도에 관한 병력	String		
CRFSTAT			CRF상태	LOCK	String		
100		CSYN	최근(2개월 이내) 자살시도에 관한 병력	1=예 2=아니오	Integer		
101		CSA1	시도방법_음독	1=음독	Integer		
102		CSA2	시도방법_농약	1=농약	Integer		
103	CSA3	시도방법_목매	1=목매	Integer			
104	CSA4	시도방법_칼 등 날카로운 물질	1=칼 등 날카로운 물질	Integer			
105	CSA5	시도방법_투신/추 락	1=투신/추락	Integer			
106	CSA6	시도방법_교통수 단	1=교통수단	Integer			
107	CSA7	시도방법_가스흡	1=가스흡입	Integer			

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			입			
	108	CSA8	시도방법_익사	1=익사	Integer	
	109	CSA9	시도방법_미상	1=미상	Integer	
	110	CSA10	시도방법_기타	1=기타	Integer	
	111	CSP	자살시도_장소	1=주택 2=집단거주시설 3=학교 기타 시설 및 공공행정 구역 4=운동 및 경기장 5=도로 및 고속도로 6=상업 및 서비스 구역 7=산업 및 건설 지역 8=농장 9=기타 명시된 장소 10=상세불명 장소	Integer	
	112	CSP1	자살시도_장소_주택	1=주택	Integer	
	113	CSP2	자살시도_장소_집단거주시설	1=집단주거시설	Integer	
	114	CSP3	자살시도_장소_학교, 기타 시설 및 공공행정 구역	1=학교, 기타 시설 및 공공행정 구역	Integer	
	115	CSP4	자살시도_장소_운동 및 경기장	1=운동 및 경기장	Integer	
	116	CSP5	자살시도_장소_도로 및 고속도로	1=도로 및 고속도로	Integer	
	117	CSP6	자살시도_장소_상업 및 서비스구역	1=상업 및 서비스 구역	Integer	
	118	CSP7	자살시도_장소_산업 및 건설지역	1=산업 및 건설지역	Integer	
	119	CSP8	자살시도_장소_농장	1=농장	Integer	
	120	CSP9	자살시도_장소_기타 명시된 장소	1=기타 명시된 장소	Integer	
	121	CSP10	자살시도_장소_상세불명 장소	1=상세불명 장소	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	122	CSAYN	자살시도 당시 음주 여부	1=음주 2=비음주	Integer	
	123	CSMT1	자살동기_가정문 제	1=가정문제	Integer	
	124	CSMT2	자살동기_경제생 활 문제	1=경제생활 문제	Integer	
	125	CSMT3	자살동기_육체적 질병 문제	1=육체적 질병 문제	Integer	
	126	CSMT4	자살동기_정신적, 정신과적 문제	1=정신적, 정신과적 문제	Integer Integer	
	127	CSMT5	자살동기_직장 또는 업무상의 문제	1=직장 또는 업무상의 문제	Integer	
	128	CSMT6	자살동기_남녀문 제	1=남녀문제	Integer	
	129	CSMT7	자살동기_사별문 제	1=사별문제	Integer	
	130	CSMT8	자살동기_학대 또는 폭력 문제	1=학대 또는 폭력 문제	Integer	
	131	CSMT9	자살동기_기타	1=기타	Integer	
	132	CSMT10	자살동기_미상	1=미상	Integer	
	133	CSMTA	자살동기_평가자 판단		String	
방문1_Colum bia Suicide Sever	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문1=Screening	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	Visit1_Columbia Suicide Sever	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
		134	CS1	1. [죽고 싶은 소망] 죽고 싶다거나 잠든 뒤 깨어나지 않았으면	1=예 2=아니오	Integer

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	135	CS1_Y	좋겠다고 바란 적이 있습니까? '예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	136	CS2	2. [비특이성 적극적 자살 생각] 실제로 자살을 생각해본 적이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	137	CS2_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	138	CS3	3. [실행 의도가 없이 어떤 방법(계획이 아닌)들을 생각하는 적극적 자살 생각] 어떻게 실행에 옮길 지 생각해본 적이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	139	CS3_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	140	CS4	4. [구체적인 계획 없이, 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각] 이런 생각을 해 본 적이 있으며 실행할 의도가 어느 정도 있었습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	141	CS4_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	142	CS5	5. [구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각] 자살 방법에 대해 자세하게 궁리하기	1=예 2=아니오	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	143	CS5_Y	시작했거나 궁리한 적이 있습니까? 이 계획을 실행에 옮길 의도가 있습니까? '예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	144	CSS0	자살 생각의 유형	1=죽고 싶은 소망 2=비특이성 적극적 자살 생각 3=실행 의도가 없이 어떤 방법들을 생각하는 적극적 자살 생각 4=구체적인 계획 없이 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각 5=구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각	Integer	
	145	CSS0_ETC	자살 생각의 설명		String	
	146	CSS1	[빈도] 평소에 이런 생각을 몇 번이나 하십니까?	1=일주일에 한 번 미만 2=일주일에 한 번 3=일주일에 2~5번 4=매일 또는 거의 매일 5=매일 여러 번	Integer	
	147	CSS2	[지속 시간] 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니까?	1=순간적 - 몇 초 또는 몇 분 2=1시간 미만 / 잠시 동안 3=1~4시간 / 한참 동안 4=4~8시간 / 하루 중 대부분 5=8시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적	Integer	
	148	CSS3	[통제 가능성] 자신이 원할 경우 자살하거나 죽고 싶다는 생각을 중단할 수 있었습니까/있습 니까?	0=생각을 통제하려고 노력하지 않는다 1=생각을 통제하기가 쉽다 2=생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다 3=생각을 통제하기가 약간 힘들다 4=생각을 통제하기가 많이 힘들다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	149	CSS4	[저지 요인] 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가 (예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있습니까?	5=생각을 통제할 수 없다 0=해당 없다. 죽고 싶을 뿐이다 1=자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다 2=저지 요인이 있는 것 같다 3=저지 요인이 있는지 확실치 않다 4=저지 요인이 없는 것 같다 5=저지 요인이 분명히 없다	Integer	
	150	CSS5	[자살 생각의 이유] 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나 어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까?	1=전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. 2=주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다 3=다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다. 4=대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 5=저지 요인이전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다).	Integer	
	151	CSSR1	[실제적 기도] 자살을 기도한 적이 있습니까? 자해를 하기 위해 무슨 일정한 적이 있습니까? 무엇을	1=예 2=아니오	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			<p>했습니까? 목숨을 끊기 위한 방법으로 ____을(를) 했습니까? ____했을 때 (조금이라도) 죽기를 원했습니까? ____했을 때 목숨을 끊으려고 했습니까? 혹은 ____으로 죽을 가능성이 있다는 생각을 했습니까? 혹은 순전히 다른 이유로 / 자살할 의도가 전혀 없이(예를 들면, 스트레스를 풀기 위해, 기분 전환을 위해, 동정심을 얻으려고, 또는 상황을 바꾸기 위해서) 그런 일을 했습니까? (자살 의도가 없는 자해 행동)</p>			
	152	CSSR1_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	153	CSSR1_Y_CN T	총 기도 수		Integer	
	154	CSSR2	피험자는 비자살적 자해 행동을 했습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	155	CSSR3	[방해된 기도] 목숨을 끊기 위해 무엇인가를 시작했지만	1=예 2=아니오	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			실제로 실행하기 전에 누군가에 의해 또는 무슨 일로 중단된 때가 있습니까? '예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	156	CSSR3_Y			String	
	157	CSSR3_Y_CN T	총 방해된 기도 수		Integer	
	158	CSSR4	[중단된 기도] 목숨을 끊으려고 무슨 일을 시작했지만 실제로 행하기 전에 스스로 중단한 때가 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	159	CSSR4_Y			String	
	160	CSSR4_Y_CN T	총 중단된 기도 수		Integer	
	161	CSSR5	[준비 행위나 행동] 자살을 기도하거나 자살을 준비하기 위한 행동(즉, 약물 수집, 총기 구입, 소중한 물건 나눠주기, 자살 메모 적기)을 취한 적이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	162	CSSR5_Y			String	
	163	CSSRS6	[자살 행동] 평가 기간 동안 자살 행동이 있었다 가장 최근에	1=예 2=아니오	Integer	
	164	CSSRSDT1	발생한 기도 날짜	YYYY-MM-DD	Date	
	165	CSSRSDT2	가장 치명적인 기도 날짜	YYYY-MM-DD	Date	
	166	CSSRSDT3	최초의 기도	YYYY-MM-DD	Date	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	167	CSSRSCD1	날짜 가장 최근에 발생한 기도날짜_코드입 력1	0=신체적 손상이 없거나 매 우 경미한 신체적 손상(예: 찰 과상) 1=경미한 신체적 손상(예: 어 눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) 2=보통의 신체적 손상; 의학 적인 주의 필요(예: 의식은 있 으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈 관의 출혈) 3=어느 정도 심각한 신체적 손상; 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상 태, 신체20%미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심 각한 골절) 4=심각한 신체적 손상; 입원 과 함께 집중적인 치료 요구 (예: 반사 능력이 손상된 혼수 상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각 한 손상) 5=사망	Integer	
	168	CSSRSCD2	가장 치명적인 기도날짜_코드입 력2	0=신체적 손상이 없거나 매 우 경미한 신체적 손상(예: 찰 과상) 1=경미한 신체적 손상(예: 어 눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) 2=보통의 신체적 손상; 의학 적인 주의 필요(예: 의식은 있 으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈 관의 출혈) 3=어느 정도 심각한 신체적 손상; 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				태, 신체20%미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절) 4=심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구 (예: 반사 능력이 손상된 혼수 상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) 5=사망		
	169	CSSRSCD3	최초의 기도 날짜_코드입력3	0=신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(예: 찰과상) 1=경미한 신체적 손상(예: 어눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) 2=보통의 신체적 손상; 의학적인 주의 필요(예: 의식은 있으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈관의 출혈) 3=어느 정도 심각한 신체적 손상; 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상되지 않은 혼수 상태, 신체20%미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절) 4=심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구 (예: 반사 능력이 손상된 혼수 상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) 5=사망	Integer	
	170	CSSRSCD4	가장 최근에 발행한 기도 날짜_코드입력4	0=상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 1=상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능성이 거의 없는 행동	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
	171	CSSRSCD5	가장 치명적인 기도 날짜_코드입력5	2=의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높 은 행동	Integer	
				0=상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 1=상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능 성이 거의 없는 행동 2=의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높 은 행동		
	172	CSSRSCD6	최초의 기도 날짜_코드입력6	0=상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 1=상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능 성이 거의 없는 행동 2=의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높 은 행동	Integer	
공통_Columb ia Suicide Severity	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	공통_Columbia Suicide Severity	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
		173	CS1_1	1. [죽고 싶은 소망] 죽고 싶다거나 잠든	1=예 2=아니오	Integer

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			뒤 깨어나지 않았으면 좋겠다고 바란 적이 있습니까?			
	174	CS1_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	175	CS2_1	2. [비특이성 적극적 자살 생각] 실제로 자살을 생각해본 적이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	176	CS2_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	177	CS3_1	3. [실행 의도가 없이 어떤 방법(계획이 아닌)들을 생각하는 적극적 자살 생각] 어떻게 실행에 옮길 지 생각해본 적이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	178	CS3_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	179	CS4_1	4. [구체적인 계획 없이, 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각] 이런 생각을 해 본 적이 있으며 실행할 의도가 어느 정도 있었습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	180	CS4_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	181	CS5_1	5. [구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각] 자살 방법에 대해	1=예 2=아니오	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			자세하게 공리하기 시작했거나 공리한 적이 있습니까? 이 계획을 실행에 옮길 의도가 있습니까?			
	182	CS5_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	183	CSS0_1	자살 생각의 유형	1=죽고 싶은 소망 2=비특이성 적극적 자살 생각 3=실행 의도가 없이 어떤 방법들을 생각하는 적극적 자살 생각 4=구체적인 계획 없이 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각 5=구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각	Integer	
	184	CSS0_ETC_1	자살 생각의 설명		String	
	185	CSS1_1	[빈도] 평소에 이런 생각을 몇 번이나 하십니까?	1=일주일에 한 번 미만 2=일주일에 한 번 3=일주일에 2~5번 4=매일 또는 거의 매일 5=매일 여러 번	Integer	
	186	CSS2_1	[지속 시간] 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니까?	1=순간적 - 몇 초 또는 몇 분 2=1시간 미만 / 잠시 동안 3=1~4시간 / 한참 동안 4=4~8시간 / 하루 중 대부분 5=8시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적	Integer	
	187	CSS3_1	[통제 가능성] 자신이 원할 경우 자살하거나 죽고 싶다는 생각을 중단할 수 있었습니까/있습 니까?	0=생각을 통제하려고 노력하지 않는다 1=생각을 통제하기가 쉽다 2=생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다 3=생각을 통제하기가 약간 힘들다 4=생각을 통제하기가 많이	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				힘들다 5=생각을 통제할 수 없다		
	188	CSS4_1	[저지 요인] 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가 (예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있습니까?	0=해당 없다. 죽고 싶을 뿐이다 1=자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다 2=저지 요인이 있는 것 같다 3=저지 요인이 있는지 확실치 않다 4=저지 요인이 없는 것 같다 5=저지 요인이 분명히 없다	Integer	
	189	CSS5_1	[자살 생각의 이유] 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나 어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까?	1=전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. 2=주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다 3=다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다. 4=대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). 5=저지 요인이전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다).	Integer	
	190	CSSR1_1	[실제적 기도] 자살을 기도한 적이 있습니까? 자해를 하기 위해 무슨 일을 한 적이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			무엇을 했습니까? 목숨을 끊기 위한 방법으로 ____을(를) 했습니까? ____했을 때 (조금이라도) 죽기를 원했습니까? ____했을 때 목숨을 끊으려고 했습니까? 혹은____으로 죽을 가능성이 있다는 생각을 했습니까? 혹은 순전히 다른 이유로 / 자살할 의도가 전혀 없이(예를 들면, 스트레스를 풀기 위해, 기분 전환을 위해, 동정심을 얻으려고, 또는 상황을 바꾸기 위해서) 그런 일을 했습니까? (자살 의도가 없는 자해 행동)			
	191	CSSR1_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	192	CSSR1_Y_CN T_1	총 기도 수		Integer	
	193	CSSR2_1	피험자는 비자살적 자해 행동을 했습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	194	CSSR3_1	[방해된 기도] 목숨을 끊기 위해 무엇인가를	1=예 2=아니오	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			시작했지만 실제로 실행하기 전에 누군가에 의해 또는 무슨 일로 중단된 때가 있습니까?			
	195	CSSR3_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	196	CSSR3_Y_CN T_1	총 방해된 기도 수		Integer	
	197	CSSR4_1	[중단된 기도] 목숨을 끊으려고 무슨 일을 시작했지만 실제로 행하기 전에 스스로 중단한 때가 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	198	CSSR4_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	199	CSSR4_Y_CN T_1	총 중단된 기도 수		Integer	
	200	CSSR5_1	[준비 행위나 행동] 자살을 기도하거나 자살을 준비하기 위한 행동(즉, 약물 수집, 총기 구입, 소중한 물건 나눠주기, 자살 메모 적기)을 취한 적이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	201	CSSR5_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.		String	
	202	CSSRS6_1	[자살 행동] 평가 기간 동안 자살 행동이 있었다	1=예 2=아니오	Integer	
	203	CSSRSDT2_1	가장 치명적인 기도 날짜	YYYY-MM-DD	Date	
	204	CSSRSCD2_1	가장 치명적인 기도날짜_코드입 력2	0=신체적 손상이 없거나 매 우 경미한 신체적 손상(예: 찰 과상)	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				1=경미한 신체적 손상(예: 어 눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) 2=보통의 신체적 손상; 의학 적인 주의 필요(예: 의식은 있 으나 혼미한 상태—어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈 관의 출혈) 3=어느 정도 심각한 신체적 손상; 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상 태, 신체20%미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심 각한 골절) 4=심각한 신체적 손상; 입원 과 함께 집중적인 치료 요구 (예: 반사 능력이 손상된 혼수 상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각 한 손상) 5=사망		
	205	CSSRSCD5_1	가장 치명적인 기도 날짜_코드입력5	0=상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 1=상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능 성이 거의 없는 행동 2=의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높 은 행동	Integer	
	206	CSSRS7_1	완료된 자살	1=예 2=아니오	Integer	
Beck's Suicide Intent Scale	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공		
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	Beck's Suicide Intent Scale	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	207	SISND	SIS ND	1=Not Determined(ND)	Integer	
	208	SISTO	Total	SISP1_1+SISP1_2+...+SISP2_7 점수 총합	String	
	209	SISP1SUB	Part 1(circumstances) subtotal	SISP1_1+SISP1_2+...+SISP1_8 점수 총합	String	
	210	SISP2SUB	Part 2(self-report) subtotal	SISP2_1+SISP2_2+...+SISP2_7 점수 총합	String	
	211	SISP1_1	1. 고립	0=누군가 있음 1=누군가 가까이 있거나 연락이 가능함(전화통화) 2=가까이 있거나 연락 가능한 사람이 없음	Integer	
	212	SISP1_2	2. 시간	0=개입이 가능한 때 시도 1=개입이 어려운 때 시도 2=개입이 거의 불가능할 때 시도	Integer	
	213	SISP1_3	3. 발견/개입에 대한 경계	0=경계하지 않음 1=수동적인 경계, 다른 사람을 피했지만 개입하지 못하도록 방해하지는 않음(잠겨있지 않은 방에 혼자 있기) 2=적극적인 경계(문을 잠금)	Integer	
	214	SISP1_4	4. 시도하는 동안 또는 시도 후 도움을 요청하는 행동(적용불가)	0=도움을 줄 수 있는 사람에게 자살시도에 대해 미리 알렸음 1=도움을 줄 수 있는 사람과 접촉을 하였으나 자살시도에 대해 특별히 언급하지 않았음 2=도움을 줄 수 있는 사람과 접촉하거나 도움을 요청하지	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	215	SISP1_5	5. 죽음 준비행동	0=없음 1=죽음을 기대하며 주변정리를 생각하거나 생각했음 2=세워진 명확한 계획이 있었음(예, 선물을 나눠줌. 보험가입)	Integer	
	216	SISP1_6	6. 자살시도 계획정도	0=준비하지 않음 1=약간의 준비 2=광범위한 준비	Integer	
	217	SISP1_7	7. 유서	0=없음 1=썼으나 찢어버림, 혹은 생각을 적어 놓음 2=유서가 있음	Integer	
	218	SISP1_8	8. 자살시도 전에 자살의도에 대한 표현	0=없음 1=모호한 표현을 했음 2=명확한 표현을 했음	Integer	
	219	SISP2_1	1. 자살시도의 목적	0=주로 주변을 바꾸거나 조종하려 함 1="0"과 "2"의 요소를 모두 갖고 있음 2=주로 자신을 주변으로부터 제거하려 함	Integer	
	220	SISP2_2	2. 치명적인 행동과 관련된 기대	0=죽지 않을 것이라 생각했거나, 죽음에 대해 생각하지 않았음 1=죽을 수도 있지만 그렇게 되지는 않을 것이라 생각했음 2=죽을 것이 틀림없거나 확실하다고 생각했음	Integer	
	221	SISP2_3	3. 방법의 치명성에 대한 생각	0=생각했던 것보다 상해정도가 심하지 않았거나 치명성에 대해 생각하지 않았음 1=자신의 행동이 치명적일 것이라고 확신하지 않았거나 치명적일 수도 있다고 생각했음 2=환자가 생각했던 것 이상, 또는 동일한 정도로 치명적임	Integer	
	222	SISP2_4	4. 자살시도의 심각성	0=자신의 행동을 인생을 끝내기 위한 심각한 시도로	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				생각하지 않음 1=자신의 행동이 인생을 끝내기 위한 심각한 시도인지 확신이 없음 2=자신의 행동을 인생을 끝내기 위한 심각한 시도라고 생각함		
	223	SISP2_5	5. 삶에 대한 양가적 생각	0=죽고 싶어 하지 않음 1=살든지 죽든지 관심 없음 2=죽기를 원함	Integer	
	224	SISP2_6	6. 회복에 대한 생각	0=의학적 치료를 받는다면 죽지 않을 것이라 생각함 1=의학적 치료를 통해 죽음을 피할 수 있을지 확신하지 못함 2=의학적 치료를 받더라도 죽을 것이라 확신함	Integer	
	225	SISP2_7	7. 사전고려의 정도	0=충동적 1=자살시도 하기 전 3시간 혹은 그 보다 짧은 시간 숙고하였음 2=자살시도 하기 전 3시간 이상 숙고하였음	Integer	
21-Items Hamilton Depression	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	21-Items Hamilton Depression	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	226	21IHD1	1. Depression mood (sadness, hopeless, worthless)	0=없다. 1=물어보았을 때만 우울한 기분이라고 말한다. 2=자발적으로 우울한 기분이라고 말한다. 3=얼굴 표정, 자세, 목소리, 쉽게 우는 경향과 같은 비언어적인 표현을 통해 우울한 기분을 나타낸다. 4=오로지 우울한 기분만을, 언어적·비언어적 표현을 통해 나타낸다.	Integer	
	227	21IHD2	2. Feeling of guilty	0=없다. 1=자책하거나 자신이 사람들을 실망시킨다고 느낀다. 2=죄를 지었다고 생각한다던가 과거의 실수나 자신이 한 나쁜 행위에 대해 반복적으로 생각한다. 3=현재의 병을 별로 여긴다. 죄책망상이 있다. 4=비난 또는 탄핵하는 목소리를 듣거나 위협적인 환시를 경험한다.	Integer	
	228	21IHD3	3. Suicide	0=없다. 1=인생이 살 가치가 없다고 느낀다. 2=차라리 죽었으면 하거나 죽는 것에 대한 상상을 한다. 3=자살 사고가 있거나 자살기도처럼 볼 수 있는 행동을 한다. 4=심각한 자살 기도를 한다.	Integer	
	229	21IHD4	4. Insomnia early	0=잠드는 데 어려움이 없다. 1=간간이 잠들기가 어렵다(잠드는 데 30분 이상 걸린다). 2=매일 밤 잠들기가 어렵다.	Integer	
	230	21IHD5	5. Insomnia middle	0=어려움이 없다. 1=편하고 깊게 자지 못한다.	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				2=한밤중에 깨어 뒤척이거나 잠자리에서 벗어나는 경우 2점으로 평가한다(소변을 보기 위한 경우는 제외한다).		
	231	21IHD6	6. Insomnia late	0=어려움이 없다. 1=새벽에 깨지만 다시 잠이 든다. 2=일단 깨어나면 다시 잠들 수 없다.	Integer	
	232	21IHD7	7. Work and activities	0=어려움이 없다. 1=제대로 할 수 없다고 느낀다. 일이나 취미와 같은 활동에 대해 피로하거나 기력이 떨어졌다고 느낀다. 2=일이나 취미와 같은 활동에 흥미를 잃는다 - 환자가 직접 이야기하거나 무관심, 우유부단, 망설임을 통해 간접적으로 나타낸다(일이나 활동을 억지로 한다고 느낀다). 3=활동 시간이 줄거나 생산성이 떨어져 있다. 입원 환자의 경우, 병동생활에서의 개인적인 자질구레한 일 을 제외한 활동(원내 작업이나 취미)에 보내는 시간이 하루 3시간을 넘지 못한다. 4=현재의 병 때문에 일을 중단한다. 입원 환자의 경우, 병동생활에서의 개인적인 자질구레한 일 이외에는 전혀 활동을 하지 않거나 도움 없이는 병동생활에서의 개인적인 자질구레한 일도 해내지 못한다.	Integer	
	233	21IHD8	8. Retardation	0=정상적으로 말하고 생각한다. 1=면담할 때 약간 지체되어 있다.	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				2=면담할 때 뚜렛이 지체되어 있다. 3=면담이 어려울 정도로 지체되어 있다. 4=완전한 혼미 상태에 있다.		
	234	21IHD9	9. Agitation	0=없다. 1=조금 초조한 듯하다. 2=손이나 머리카락 등을 만지작거린다. 3=가만히 앉아 있지 못하고 몸을 자꾸 움직인다. 4=손을 비비꼬거나 손톱을 물어뜯거나 머리카락을 잡아당기거나 입술을 깨문다.	Integer	
	235	21IHD10	10. Anxiety psychic	0=없다. 1=긴장감과 과민함을 느낀다. 2=사소한 일들에 대해 걱정을 한다. 3=얼굴 표정이나 말에서 염려하는 태도가 뚜렛하다. 4=묻지 않아도 심한 공포가 드러난다.	Integer	
	236	21IHD11	11. Anxiety somatic	0=없다 1=경도 2=중등도 3=고도 4=최고도(기능을 전혀 할 수 없을 정도이다).	Integer	
	237	21IHD12	12. Somatic symptoms gastrointestinal	0=없다. 1=입맛을 잃었지만 치료진의 격려 없이도 먹는다. 속이 더부룩하다. 2=치료진의 강요 없이는 잘 먹지 않는다. 하제나 소화제 등 위장관계 증상에 대한 약제를 요구하거나 필요 로 한다.	Integer	
	238	21IHD13	13. Somatic symptoms general	0=없다. 1=팔, 다리, 등, 머리가 무겁다. 등의 통증, 두통, 근육통. 기운이 없고 쉽게 피곤해진다.	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	239	21IHD14	14. Genital symptoms	2=매우 뚜렷한 신체증상이 있다. 0=없다 1=경도 2=고도	Integer	
	240	21IHD15	15. Hypochondriasis	0=없다. 1=몸에 대해 많이 생각한다. 2=건강에 대해 집착한다. 3=건강이 나쁘다고 자주 호소하거나 도움을 청한다. 4=건강염려증적 망상이 있다.	Integer	
	241	21IHD16	16. Loss of weight	A 또는 B로 평가한다. A. 병력에 의해 평가할 때 0=체중감소가 없다. 1=현재의 병으로 인해 체중감소가 있는 것 같다. 2=(환자에 따르면) 확실한 체중감소가 있다. B. 매주 체중 변화를 측정했을 때 0=주당 0.5kg 미만의 체중감소. 1=주당 0.5kg 이상, 1kg 미만의 체중감소. 2=주당 1kg 이상의 체중감소.	Integer	
	242	21IHD17	17. Insight	0=자신이 우울하고 병들었다는 것을 인식한다. 1=병들었다는 것을 인정하지만 음식, 날씨, 과로, 바이러스, 휴식 부족 등이 이유라고 생각한다. 2=자신의 병을 전적으로 부인한다.	Integer	
	243	21IHD18	18. Diurnal variation	A. 증상이 오전이나 혹은 오후에 나빠지는가를 확인해서 표시 0= 변동 없음 1= 오전에 나빠짐 2= 오후에 나빠짐 B. 일중 변화가 있을 때, 변화의 심한 정도를	Integer	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
				표시하고, 만약 없다면 없음으로 표시 0= 없음 1= 경도 2= 심한 정도		
	244	21IHD19	19. Depersonalization and derealization	0= 없음 1= 경도 2= 중등도 3= 중증 4= 거의 무능력 상태	Integer	
	245	21IHD20	20. Paranoid symptom	0= 없음 1= 의심증 2= 관계사고 3= 관계망상과 피해망상	Integer	
	246	21IHD21	21. Obsession and compulsion	0= 없음 1= 경도 2= 심한 정도	Integer	
	247	21IHDTO	총점 (TOTAL SCORE)	21IHD1+21IHD2+...+21IHD21 점수 총합	String	
Beck's Scale for Suicidal Id	공통 변수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	Beck's Scale for Suicidal Id	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	248	BSSI1	1. 살고 싶은 소 망이 있나요?	0=보통 혹은 많이 있다. 1=약간 있다. 2=전혀 없다.	Integer	
	249	BSSI2	2. 죽고 싶은 소망이 있나요?	0=전혀 없다. 1=약간 있다. 2=보통 혹은 많이 있다.	Integer	
	250	BSSI3	3. 살고 싶은 이유 / 죽고 싶은 이유는 무엇인가요?	0=사는 것이 죽는 것 보다 낮기 때문에 1=사는 것이나 죽는 것이나 마찬가지다. 2=죽는 것이 사는 것보다 낮기 때문에	Integer	
	251	BSSI4	4. 실제로 자살시도를 하려는 욕구가 있나요?	0=전혀 없다. 1=약간 있다. 2=보통 혹은 많이 있다.	Integer	
	252	BSSI5	5. 별로 적극적이지 않고 수동적인 자살 욕구가 생길 때는 어떻게 할 것인가요?	0=생명을 건지기 위해 필요한 조치를 미리 할 것이다. 1=삶과 죽음을 운명에 맡기겠다. 2=살기 위한 노력을 하지 않겠다.	Integer	
	253	BSSI6	6. 자살하고 싶은 생각이나 소망이 얼마나 오랫동안 지속되나요?	0=잠깐 그런 생각이 들다가 곧 사라진다. 1=한동안 그런 생각이 계속된다. 2=계속, 거의 항상 그런 생각이 지속된다.	Integer	
	254	BSSI7	7. 얼마나 자주 자살하고 싶은 생각이 드나요?	0=거의 그런 생각이 들지 않는다. 1=가끔 그런 생각이 든다. 2=그런 생각이 계속 지속된다.	Integer	
	255	BSSI8	8. 자살생각이나 소망에 대한 귀하의 태도는 어떤가요?	0=절대로 받아들이지 않는다. 1=양가적이나 크게 개의치 않는다. 2=그런 생각을 받아들인다.	Integer	
	256	BSSI9	9. 자살하고 싶은 충동을 통제할 수 있나요?	0=충분히 통제할 수 있다. 1=통제 할 수 있을지 확신 할 수 없다. 2=전혀 통제할 수 없을 것 같다.	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	257	BSSI10	10. 자살시도에 대한 방해물이 있다면 어떻게 할 것인가요? (예:가족, 종교, 다시 살 수 없다는 생각 등)	0=방해물 때문에 자살 시도를 하지 않을 것이다. 1=방해물 때문에 조금은 마음이 쓰인다. 2=방해물에 개의치 않는다.	Integer	
	258	BSSI11	11. 자살에 대해 깊게 생각해 본 이유는 무엇인가요?	0=자살에 대해 생각해 본 적이 없다. / 주변 사람들을 조종하기 위해서 : 관심을 끌거나 보복하기 위해서 1=주변 사람들의 관심을 끌고 보복하거나, 현실 도피의 방법으로 2=현실 도피적인 문제해결 방법으로	Integer	
	259	BSSI12	12. 자살에 대해 깊게 생각 했을 때 구체적인 방법까지 계획 했나요?	0=자살에 대해 생각해 본 적이 없다. 1=자살 생각을 했으나 구체적인 방법까지는 생각하지 않았다 2=구체적인 방법을 자세하고 치밀하게 생각해 놓았다.	Integer	
	260	BSSI13	13. 자살 방법을 깊게 생각 했다면 그것이 얼마나 현실적으로 실현 가능하며, 또한 시도할 기회가 있다고 생각하나요?	0=방법도 현실적으로 실현 가능하지 않고, 기회도 없을 것이다. 1=방법이 시간과 노력이 필요하며, 기회가 쉽게 오지 않을 것이다. 2=생각한 방법이 현실적으로 실현가능하며, 기회도 있을 것이다. / 앞으로 기회나 방법이 생길 것 같다.	Integer	
	261	BSSI14	14. 실제로 자살할 수 있는 능력이 있다고 생각하나요?	0=용기가 없고 너무 약하고 두렵고 능력이 없어서 자살 할 수 없다. 1=자살할 용기와 능력이 있는 지 확신할 수 없다. 2=자살할 용기와 자신이 있다.	Integer	
	262	BSSI15	15. 정말로 자살 시도를 할	0=전혀 그렇지 않다. 1=잘 모르겠다.	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			것이라고 확신하나요?	2=그렇다.		
	263	BSSI16	16. 자살에 대한 생각을 실행하기 위해 실제로 준비한 것이 있나요?	0=없다. 1=부분적으로 했다 (예: 약을 사모으기 시작함). 2=완전하게 준비했다 (예: 약을 사모았다).	Integer	
	264	BSSI17	17. 자살하려는 글(유서)을 쓴 적이 있나요?	0=없다. 1=쓰기 시작했으나 다 쓰지 못했다: 단지 쓰려고 생각했다. 2=다 써 놓았다.	Integer	
	265	BSSI18	18. 죽음을 예상하고 마지막 정리를 한 적 있나요? (예 : 보험, 유언 등)	0=없다. 1=생각만 해 보았거나, 약간의 정리를 했다. 2=확실한 계획을 세웠거나 다 정리를 해 놓았다.	Integer	
	266	BSSI19	19. 자살에 대한 생각을 다른 사람들에게 이야기한 적이 있습니까, 혹은 속이거나 숨겼습니까?	0=자살에 대해 생각해 본 적이 없다. / 다른 사람에게 터놓고 이야기 하였다. 1=드러내는 것을 주저하다가 숨겼다. 2=그런 생각을 속이고, 숨겼다.	Integer	
	267	BSSITO	총점	BSSI1+BSSI2+...+BSSI19 점수 총합	String	
Generalized Anxiety Disorder	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독교병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	

도메인명	변수번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수유형	길이
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	Generalized Anxiety Disorder	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	268	GADTOT	총점	GAD1+GAD2+...+GAD7 점수 총합	String	
	269	GAD1	1. 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다	0= 전혀 방해 받지 않았다 1=며칠 동안 방해 받았다 2=7일 이상 방해 받았다 3=거의 매일 방해 받았다	Integer	
	270	GAD2	2. 걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다	0= 전혀 방해 받지 않았다 1=며칠 동안 방해 받았다 2=7일 이상 방해 받았다 3=거의 매일 방해 받았다	Integer	
	271	GAD3	3. 여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다	0= 전혀 방해 받지 않았다 1=며칠 동안 방해 받았다 2=7일 이상 방해 받았다 3=거의 매일 방해 받았다	Integer	
	272	GAD4	4. 편하게 있기가 어렵다	0= 전혀 방해 받지 않았다 1=며칠 동안 방해 받았다 2=7일 이상 방해 받았다 3=거의 매일 방해 받았다	Integer	
	273	GAD5	5. 너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다	0= 전혀 방해 받지 않았다 1=며칠 동안 방해 받았다 2=7일 이상 방해 받았다 3=거의 매일 방해 받았다	Integer	
	274	GAD6	6. 쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다	0= 전혀 방해 받지 않았다 1=며칠 동안 방해 받았다 2=7일 이상 방해 받았다 3=거의 매일 방해 받았다	Integer	
275	GAD7	7. 마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다	0= 전혀 방해 받지 않았다 1=며칠 동안 방해 받았다 2=7일 이상 방해 받았다 3=거의 매일 방해 받았다	Integer		
Barratt Impulsiveness Scale	공통 변수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 +	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				집중사례관리서비스 제공		
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	Barratt Impulsiveness Scale	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	276	KBIS1	1. 나는 일을 시작하기 전에 세밀하게 계획을 세운다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다	Integer	
	277	KBIS2	2. 나는 깊이 생각하지 않고 일을 한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	278	KBIS3	3. 나는 결정을 빨리 내리는 편이다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	279	KBIS4	4. 나는 낙천적인 사람이다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	280	KBIS5	5. 나는 집중을 잘 못한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	281	KBIS6	6. 나는 온갖 생각을 쉬지 않고 떠올린다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	282	KBIS7	7. 나는 여행을 떠나기 전에 세밀하게 계획을 세운다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다	Integer	
	283	KBIS8	8. 나는 자제력이 있는 편이다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다	Integer	
	284	KBIS9	9. 나는 어떤 일에든지 쉽게 집중할 수 있다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	285	KBIS10	10. 나는 꾸준히 저축을 한다.	4=전혀 그렇지 않다 1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다	Integer	
	286	KBIS11	11. 나는 일(공부)할 때나 놀 때 잠시도 몸을 가만히 두지 못한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	287	KBIS12	12. 나는 주의깊게 생각하는 사람이다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다	Integer	
	288	KBIS13	13. 나는 안정된 직장(학교) 생활을 유지하려 애쓴다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다	Integer	
	289	KBIS14	14. 나는 깊이 생각하지 않고 말을 한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	290	KBIS15	15. 나는 복잡한 문제를 놓고 생각하는 것을 좋아한다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다	Integer	
	291	KBIS16	16. 나는 직장(학교나 학원 등)을 옮겨 다닌다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	292	KBIS17	17. 나는 충동적으로 행동한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	293	KBIS18	18. 나는 복잡한 문제에 대해 생각하려고 하면 곧 싫증이 난다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	294	KBIS19	19. 나는 즉흥적으로 생각한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	295	KBIS20	20. 나는 골똘히 생각하는 편이다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다		
	296	KBIS21	21. 나는 자주 이사다니는 편이다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	297	KBIS22	22. 나는 충동구매를 하곤 한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	298	KBIS23	23. 나는 한번에 하나씩만 생각한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	299	KBIS24	24. 나는 취미가 자주 바뀐다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	300	KBIS25	25. 나는 버는 것 이상으로 돈을 쓰는 편이다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	301	KBIS26	26. 나는 종종 주제와 관계없는 생각들을 하곤 한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	302	KBIS27	27. 나는 미래보다는 현재에 더 관심이 있다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	303	KBIS28	28. 나는 영화를 보거나 강의를 들을 때 가만히 앉아 있지 못한다.	1=전혀 그렇지 않다 2=가끔 그렇다 3=자주 그렇다 4=항상 그렇다	Integer	
	304	KBIS29	29. 나는 어려운 문제 푸는 것을 좋아한다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다	Integer	
	305	KBIS30	30. 나는 미래 지향적인 사람이다.	1=항상 그렇다 2=자주 그렇다 3=가끔 그렇다 4=전혀 그렇지 않다	Integer	
	306	KBISTOT	총점	KBIS1+KBIS2+...+KBIS30 점수	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
한국판 UCLA 외로움 척도 (3판)	공통 변수	SITENM	기관명	총합 경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	한국판 UCLA 외로움 척도 (3판)	String	
	CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String		
	307	UCLA1	1. 얼마나 자주 주변 사람들과 잘 통한다고 느끼십니까?	0=항상 그렇다 1=가끔 그렇다 2=드물게 그렇다 3=전혀 그렇지 않다	Integer	
	308	UCLA2	2. 얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	309	UCLA3	3. 얼마나 자주 도움을 청할 사람이 아무도 없다고 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	310	UCLA4	4. 얼마나 자주 혼자라고 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	311	UCLA5	5. 얼마나 자주 친구들 모임에 속해 있다고 느끼십니까?	0=항상 그렇다 1=가끔 그렇다 2=드물게 그렇다 3=전혀 그렇지 않다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	312	UCLA6	6. 얼마나 자주 당신 주위사람들과 비슷한 점이 많다고 느끼십니까?	0=항상 그렇다 1=가끔 그렇다 2=드물게 그렇다 3=전혀 그렇지 않다	Integer	
	313	UCLA7	7. 얼마나 자주 당신이 더 이상 아무하고도 가깝지 않다고 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	314	UCLA8	8. 얼마나 자주 당신의 흥미와 생각들이 주변사람과 나누어지지 않는다고 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	315	UCLA9	9. 얼마나 자주 자신이 적극적이고 호의적이라고 느끼십니까?	0=항상 그렇다 1=가끔 그렇다 2=드물게 그렇다 3=전혀 그렇지 않다	Integer	
	316	UCLA10	10. 얼마나 자주 사람들과 가깝다고 느끼십니까?	0=항상 그렇다 1=가끔 그렇다 2=드물게 그렇다 3=전혀 그렇지 않다	Integer	
	317	UCLA11	11. 얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	318	UCLA12	12. 얼마나 자주 다른 사람들과의 관계가 의미 없다고 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	319	UCLA13	13. 얼마나 자주 당신을 진정으로 아는 사람이 아무도 없다고 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	320	UCLA14	14. 얼마나 자주 다른	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			사람들로부터 고립되어 있다고 느끼십니까?	2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다		
	321	UCLA15	15. 얼마나 자주 당신이 원할 때에 함께 있어줄 사람을 찾을수 있다고 느끼십니까?	0=항상 그렇다 1=가끔 그렇다 2=드물게 그렇다 3=전혀 그렇지 않다	Integer	
	322	UCLA16	16. 얼마나 자주 당신을 정말 이해해 주는 사람들이 있다고 느끼십니까?	0=항상 그렇다 1=가끔 그렇다 2=드물게 그렇다 3=전혀 그렇지 않다	Integer	
	323	UCLA17	17. 얼마나 자주 수줍음을 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	324	UCLA18	18. 얼마나 자주 사람들이 당신과 진정으로 함께 있지 않고 그저 주위에 있는 것이라고 느끼십니까?	0=전혀 그렇지 않다 1=드물게 그렇다 2=가끔 그렇다 3=항상 그렇다	Integer	
	325	UCLA19	19. 얼마나 자주 당신이 얘기할 수 있는 사람들이 주변에 있다고 생각합니까?	0=항상 그렇다 1=가끔 그렇다 2=드물게 그렇다 3=전혀 그렇지 않다	Integer	
	326	UCLA20	20. 얼마나 자주 당신이 도움을 청할 수 있는 사람들이 있다고 느끼십니까?	0=항상 그렇다 1=가끔 그렇다 2=드물게 그렇다 3=전혀 그렇지 않다	Integer	
	327	UCLATOT	총점	UCLA1+UCLA2+...+UCLA20 점수 총합	String	
EQ-5D-3L , 오늘의 건강 상태	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
		SUBJNO	대상자등록번호	충남대학교병원 AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	EQ-5D-3L , 오늘의 건강 상태	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	328	EQ5D1	운동 능력	1=나는 걷는데 지장이 없다 2=나는 걷는데 다소 지장이 있다 3=나는 종일 누워있어야 한다	Integer	
	329	EQ5D2	자기 관리	1=나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다 2=나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다 3=나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다	Integer	
	330	EQ5D3	일상 행동(예 : 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)	1=나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다 2=나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다 3=나는 일상 활동을 할 수가 없다	Integer	
	331	EQ5D4	통증/불편	1=나는 통증이나 불편감이 없다 2=나는 다소 통증이나 불편감이 있다 3=나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다	Integer	
	332	EQ5D5	불안/우울	1=나는 불안하거나 우울하지 않다 2=나는 다소 불안하거나 우울하다	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	333	VAS	오늘의 건강 상태	3=나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다 오늘의 건강상태의 정도를 수치로 표현한 도구	Integer	
CSRI (Client Service Receipt	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	CSRI (Client Service Receipt	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	334	CSRI1	1. 지난 1개월동안 다음 서비스를 이용했습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	335	CSRI1_1	서비스 유형	1=응급실 방문	Integer	
	336	CSRI1_2	횟수		Integer	
	337	CSRI1_3	서비스 유형	1=입원치료 2=외래방문 3=의사 처방약물 복용	Integer	
	338	CSRI1_4	진료과목	1=정신건강의학과 2=그 외 진료과목	Integer	
	339	CSRI1_5	일		Integer	
340	CSRI2	2. 지난 1개월간 건강상태 때문에 며칠동안 휴가(병가)를 냈습니까?		Integer		
341	CSRI3	3. 지난 1개월간 정신건강복지센 터를 몇 번 방문하십니까?		Integer		

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	342	CSRI4	4. 지난 1개월간 다른 지역사회기반 서비스를 이용하셨습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	343	CSRI4_1	지역사회 기반서비스의 명칭 (민간운영)		String	
	344	CSRI4_2	횟수		Integer	
	345	CSRI4_3	비용(1개월)		Integer	
	346	CSRI5	5. 지난 1개월간 건강보조식품을 복용하였습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	347	CSRI5_1_CNT	오메가-3 (피쉬오일)_횟수		Integer	
	348	CSRI5_1_CT	오메가-3 (피쉬오일)_비용		Integer	
	349	CSRI5_2_CNT	유산균(프로바이 오틱스)/프리바이 오틱스_횟수		Integer	
	350	CSRI5_2_CT	유산균(프로바이 오틱스)/프리바이 오틱스_비용		Integer	
	351	CSRI5_3_CNT	비타민/미네랄_횟 수		Integer	
	352	CSRI5_3_CT	비타민/미네랄_비 용		Integer	
	353	CSRI5_4_CNT	약초약물/허브차 (예: 세인트존스워트, 홍삼, 강황, 녹차 등)_횟수		Integer	
	354	CSRI5_4_CT	약초약물/허브차 (예: 세인트존스워트, 홍삼, 강황, 녹차 등)_비용		Integer	
	355	CSRI5_5_NM	기타_건강보조식 품종류		String	
	356	CSRI5_5_CNT	기타_횟수 (병당, 팩당 등.)		Integer	
	357	CSRI5_5_CT	기타_단위당 비용		Integer	
	358	CSRI6	6. 병원을 방문하는데 소요되는		Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			편도시간: 건강 및 사회복지전문가 들을 만나기 위해 편도이동에 소요된 평균시간을 말씀해 주십시오			
	359	CSRI7	7. 병원 방문시/ 건강 및 사회복지전문가 들을 만나기 위해 편도이동에 따른 금액을 말씀해 주십시오.		Integer	
	360	CSRI8_1	8-1 혼자 거주하십니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	361	CSRI8_2	8-2 만일 당신이 개/고양이와 같은 애완동물을 키우신다면, 1개월동안 애완동물을 위해 얼마를 쓰십니까?		Integer	
	362	CSRI9	9. 일상생활에 도움을 준 사람은 누구입니까?(예: 요리, 청소, 쇼핑, 운전, 은행일/비용 지불, 감독/관찰 등) 다음중 하나를 선택해 주세요.	1=보호자(가족, 친구등의 무급간병인) 2=간병인(공공부문에서 급여지급) 3=도우미(개인적으로 급여지급) 4=없음	Integer	
	363	CSRI10_1	1) 만일 그렇다면, 일주일에 몇 시간동안 당신을 도와/돌보아 주었나요?		Integer	
	364	CSRI10_2	2) 지난	1=예	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			1개월동안 당신을 돌보거나 방문하기 위해 보호자가 일을 줄이거나 직장을 쉬었습니까?	2=아니오		
치료 지속 여부	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		ARMSFACTORS	무작위배정기관	01.경희대학교병원 02.고려대학교 안암병원 03.순천향대학교 부속 천안병원 04.원주세브란스 기독병원 05.차의과대학교 일산차병원 06.충남대학교병원	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	치료 지속 여부	String	
	CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String		
	365	TRTYN	치료 중단 여부	1=예 2=아니오	Integer	
	366	TRTCA	치료순응도	1=Very good 2=Good 3=Fairly good 4=Poor	Integer	
	367	APPDT	외래 예약일	YYYY-MM-DD	Date	
	368	APPDT_ND	외래예약 ND	1=Not deteminded	Integer	
	369	DTYN	방문여부(O,X)	1=O 2=X	Integer	
370	TRTDT	실제 외래	YYYY-MM-DD	Date		

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	371	SLEYN	진료일 지난 방문 이후 스트레스가 될 만한 안 좋은 생활 사건이 있었나요?	1=예 2=아니오	Integer	
	372	SLEY_ETC	'예'인 경우, 그 내용을 적으시오		String	
	373	SLEEF	그 생활사건이 환자의 생활에 얼마나 큰 영향을 주었습니까?	1=전혀 영향 없었음 2=약간 영향 3=중등도 영향 4=심각한 영향	Integer	
	374	SAYN	지난 방문 이후 자살 시도가 발생하였습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	375	TRDTTOT	총 외래방문 횟수		Integer	
방문3_집중사 례관리서비스	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	방문3_집중사례관리서비스	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
		376	V3_ACMYN	지난 방문 이후 사례관리 서비스를 시행 하였습니까?	1=예(시험군) 2=아니오(대조군)	Integer
	377	V3_ACMTYPE	상담유형	1=화상 2=방문	Integer	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
	378	V3_ACMFAM	상담대상	3=내원 1=환자 2=가족	Integer	
	379	V3_ACMDT	상담일자	YYYY-MM-DD	Date	
	380	V3_ACMTM	상담소요시간		String	
	381	V3_ACMTOT	상담 총 횟수		Integer	
	382	V3_ACMUNT	비대면		Integer	
	383	V3_ACMETC	상담(전화/특) 기타(문자메시지/ 앱메시지)		Integer	
	384	V3_ACMPRM	교육 및 프로그램(환자/가 족 모두 포함)		Integer	
	385	V3_ACMSRV	서비스 연계 및 모니터링(대면/비 대면 면담 모두 포함)		Integer	
	386	V3_PRSTF	제공받은 서비스 전반에 대해 만족하는 편이다.	1=전혀 그렇지 않다 2=그렇지 않다 3=보통이다 4=그렇다 5=매우 그렇다	Integer	
방문4_집중사 례관리서비스	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	방문4_집중사례관리서비스	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
		387	V4_ACNYN	지난 방문 이후 사례관리 서비스를 시행	1=예(시험군) 2=아니오(대조군)	Integer

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
			하였습니까?			
	388	V4_ACMTYPE	상담유형	1=화상 2=방문 3=내원	Integer	
	389	V4_ACMFAM	상담대상	1=환자 2=가족	Integer	
	390	V4_ACMDT	상담일자	YYYY-MM-DD	Date	
	391	V4_ACMTM	상담시간		String	
	392	V4_ACMTOT	상담 총 횟수		Integer	
	393	V4_ACMUNT	비대면 상담(전화/문자/ 톡)		Integer	
	394	V4_ACMETC	기타(문자메시지/ 앱메시지)		Integer	
	395	V4_ACMPRM	교육 및 프로그램(환자/가 족 모두 포함)		Integer	
	396	V4_ACMSRV	서비스 연계 및 모니터링(대면/비 대면 면담 모두 포함)		Integer	
	397	V4_PRSTF	제공받은 서비스 전반에 대해 만족하는 편이다.	1=전혀 그렇지 않다 2=그렇지 않다 3=보통이다 4=그렇다 5=매우 그렇다	Integer	
방문5_집중사 례관리서비스	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT CRFNM	방문일 도메인명	YYYY-MM-DD 방문5_집중사례관리서비스	Date String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	398	V5_ACMYN	지난 방문 이후 사례관리 서비스를 시행 하였습니까?	1=예(시험군) 2=아니오(대조군)	Integer	
	399	V5_ACMTYPE	상담유형	1=화상 2=방문 3=내원	Integer	
	400	V5_ACMFAM	상담대상	1=환자 2=가족	Integer	
	401	V5_ACMDT	상담일자	YYYY-MM-DD	Date	
	402	V5_ACMTM	상담시간		String	
	403	V5_ACMTOT	상담 총 횟수		Integer	
	404	V5_ACMUNT	비대면 상담(전화/문자/ 톡)		Integer	
	405	V5_ACMETC	기타(문자메시지/ 앱메시지)		Integer	
	406	V5_ACMPRM	교육 및 프로그램(환자/가 족 모두 포함)		Integer	
	407	V5_ACMSRV	서비스 연계 및 모니터링(대면/비 대면 면담 모두 포함)		Integer	
	408	V5_PRSTF	제공받은 서비스 전반에 대해 만족하는 편이다.	1=전혀 그렇지 않다 2=그렇지 않다 3=보통이다 4=그렇다 5=매우 그렇다	Integer	
방문6_집중사 례관리서비스	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일)	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)		
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	방문6_집중사례관리서비스	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	409	V6_ACMYN	지난 방문 이후 사례관리 서비스를 시행 하였습니까?	1=예(시험군) 2=아니오(대조군)	Integer	
	410	V6_ACMTYPE	상담유형	1=화상 2=방문 3=내원	Integer	
	411	V6_ACMFAM	상담대상	1=환자 2=가족	Integer	
	412	V6_ACMDT	상담일자	YYYY-MM-DD	Date	
	413	V6_ACMTM	상담시간		String	
	414	V6_ACMTOT	상담 총 횟수		Integer	
	415	V6_ACMUNT	비대면 상담(전화/문자/ 톡)		Integer	
	416	V6_ACMETC	기타(문자메시지/ 앱메시지)		Integer	
	417	V6_ACMPRM	교육 및 프로그램(환자/가 족 모두 포함)		Integer	
	418	V6_ACMSRV	서비스 연계 및 모니터링(대면/비 대면 면담 모두 포함)		Integer	
	419	V6_PRSTF	제공받은 서비스 전반에 대해 만족하는 편이다.	1=전혀 그렇지 않다 2=그렇지 않다 3=보통이다 4=그렇다 5=매우 그렇다	Integer	
병용약물	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(기관 대상자 번호)	String	
		ARMID	무작위배정군	대조군=정신과적 표준치료 제공	String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
				시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공		
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	병용약물	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	420	CMYN	등록일 이후 우울증 및 자살 충동과 관련하여 함께 투여된 약물이 있습니까?	1=예 2=아니오	Integer	
	421	CMNM	약물명		String	
	422	CMNM_대표 코드	대표코드	대표코드	String	
	423	CMNM_업체 명	업체명	업체명	String	
	424	CMNM_ATC _CODE	ATC_Code	ATC_Code	String	
	425	CMNMETC	약물명_기타		String	
	426	CMAR	투여 경로	1=per oral(PO) 2=Intravenous(IV) 3=Intramuscular(IM) 4=Sucutaneous(SC) 5=Sublingual(SL)	Integer	
	427	CMDOSE	1일 투여량		String	
	428	CMSDT	투여시작일	YYYY-MM-DD	Date	
	429	CMEDT	투여종료일	YYYY-MM-DD	Date	
	430	CMING	지속여부	1=투여 지속 중	Integer	
	431	CMSTP	중지사유	1=효과 결여 2=복약순응도 결여 3=내약성 결여 4=치료 완료 혹은 증상 완화 5=기타	Integer	
연구중단, 종결	공 통 변 수	SITENM	기관명	경희대학교병원 고려대학교 안암병원 순천향대학교 부속 천안병원 원주세브란스 기독병원 차의과대학교 일산차병원 충남대학교병원	String	
		SUBJNO	대상자등록번호	AL-○○○(기관번호)-○○○(String	

도메인명	변수 번호	변수명	변수설명(단위)	코딩내용	변수 유형	길이
		ARMID	무작위배정군	기관 대상자 번호) 대조군=정신과적 표준치료 제공 시험군=정신과적 표준치료 + 집중사례관리서비스 제공	String	
		VISITNM	방문명	방문2=Day 0 방문3=1개월(±7일) 방문4=2개월(±7일) 방문5=3개월(±7일) 방문6=6개월(±14일)	String	
		VISITDT	방문일	YYYY-MM-DD	Date	
		CRFNM	도메인명	연구중단, 종결	String	
		CRFSTAT	CRF상태	LOCK	String	
	432	SEDT	연구 종결일	YYYY-MM-DD	Date	
	433	SESPDT	연구 중단 사유 발생일	YYYY-MM-DD	Date	
	434	SEND	연구 종료 현황	1=스크리닝 탈락 2=중도 탈락 3=연구 완료	Integer	
	435	SECA	연구 중도 탈락 사유	1=선정제외기준 위반 2=연구 참여 동의 철회 3=사망 4=자살 재시도 5=추적 소실 6=연구자 판단에 따라 더 이상 연구 진행이 어려운 경우 7=기타	Integer	
	436	SECA_ETC	연구 중도 탈락 사유_기타		String	
	437	PICONFIRM	연구자 서명		Integer	
	438	PIDT	연구자 서명일	YYYY-MM-DD	Date	

2. 변수 목록

※ 변수에 대한 코딩 정보는 변수번호를 통해 '1. 변수 상세 설명'에서 확인하실 수 있습니다.

변수 번호	변수명	변수설명
공통 변수	SITENM	기관명
	SUBJNO	대상자등록번호
	ARMID	무작위배정군
	SEX_SYS_VAL	성별
	BIRTHDT_SYS_VAL	생년월일
	VISITNM	방문명
	VISITDT	방문일
	CRFNM	도메인명
	CRFSTAT	CRF상태
1	VISIT1	환자선정방문 자료 수집일
2	IN1	선정기준 1. 만 18세 이상의 성인 남녀
3	IN2	선정기준 2. 연구 등록 1개월 내에 자살의도를 가진 자살사고 또는 2개월 내에 자살을 시도한 병력이 있으며 주요 우울증의 진단 및 통계 편람 (제 5판) (DSM-5) 진단 기준을 충족하고, 임상 평가를 토대로 간이 국제 신경정신과 면담 (MINI)에 의해 확인된 정신병적 소견이 없는 자
4	IN3	선정기준 3. 연구 참여를 스스로 결정할 수 있는 동의 능력이 있는 자
5	EX1	제외기준 1. 등록시점에서 시험대상자의 긴박한 자살 위험으로 인해 급성 정신과 입원이 임상적으로 필요한 경우로 의사가 판단한 경우
6	EX2	제외기준 2. 현재 경계성 인격 장애 등 DSM-5 기준에 따른 2축 진단기준을 충족하는 경우
7	EX3	제외기준 3. 자폐증, 치매, 또는 지적 장애의 현재 임상적 진단이 있는 경우
8	EX4	제외기준 4. 니코틴 또는 카페인을 제외하고, 스크리닝 전 6개월 이내에 DSM-5 기준에 따라 중증등 내지 중증의 물질 또는 알코올 사용 장애의 과거력이 있는 경우
9	EX5	제외기준 5. 기타 연구자가 연구 참여에 부적합하다고 판단한 경우
10	SD1	혼인상태
11	SD3F	부

변수 번호	변수명	변수설명
12	SD3M	모
13	SD3BS	형제자매
14	SD3K	자녀
15	SD4	학력
16	SD5	종교
17	SD6	의료보장
18	SD7	직업
19	SD8	월평균소득
20	SD9YN	신체병력_유무
21	SD9YN_NM	신체병력_질병명
22	SD9YN_NM_MEDD RA_VER	MedDRA_Version
23	SD9YN_NM_LLT_C ODE	MedDRA_Lowest Level Term Code
24	SD9YN_NM_LLT_N AME	MedDRA_Lowest Level Term
25	SD9YN_NM_PT_CO DE	MedDRA_Preferred Term Code
26	SD9YN_NM_PT_NA ME	MedDRA_Preferred Term
27	SD9YN_NM_HLT_C ODE	MedDRA_High Level Term Code
28	SD9YN_NM_HLT_N AME	MedDRA_High Level Term
29	SD9YN_NM_HLGT_ CODE	MedDRA_High Level Group Term Code
30	SD9YN_NM_HLGT_ NAME	MedDRA_High Level Group Term
31	SD9YN_NM_SOC_C ODE	MedDRA_System Organ Class Code
32	SD9YN_NM_SOC_ NAME	MedDRA_System Organ Class
33	SD9YN_ING	신체병력_현재 지속 여부
34	SD9YN_SEV	신체병력_중증도
35	SD10YN	평소 음주여부
36	SD11CNT	음주 횟수
37	SD11VL	1회 음주량

변수 번호	변수명	변수설명
38	SD2_1	동거인_없음
39	SD2_2	동거인_배우자
40	SD2_3	동거인_자녀
41	SD2_4	동거인_부
42	SD2_5	동거인_모
43	SD2_6	동거인_조부
44	SD2_7	동거인_조모
45	SD2_8	동거인_친구/동료
46	SD2_9	동거인_기타
47	DPSDT	현재의 에피소드가 시작된 날짜
48	DPADYN	현재의 에피소드로 인해 입원을 하였습니까?
49	DPSEYN	현재의 에피소드가 있기 전 확인 가능한 스트레스가 될 만한 안 좋은 생활 사건이 있었나요?
50	DPSEY_ETC	'예' 인 경우, 그 내용을 적으시오.
51	DPSEE	그 생활사건이 환자의 생활에 얼마나 큰 영향을 주었습니까? (직접 물어볼 것)
52	DPTM	현재의 에피소드에 대한 정신과 치료
53	DPTMYN	현재의 에피소드에 대해 투여된 약물이 있습니까?(최근 3개월 이내)
54	DPTMNM	약물명(성분명)
55	DPTMNM_대표코드	대표코드
56	DPTMNM_업체명	업체명
57	DPTMNM_ATC_CODE	ATC_Code
58	DPTMNM_E	ATC_Name
59	DPTMRT	투여경로
60	DPTMDO	1일 투여량
61	DPTMST	투여기간_시작일
62	DPTMEN	투여기간_종료일
63	DPTMING	투여기간_지속여부
64	DPTMSTOP	중지사유
65	FHSYN	자살 가족력이 있습니까?
66	FHS_Y_GF	'예'인 경우 가족관계_조부
67	FHS_Y_GM	'예'인 경우 가족관계_조모
68	FHS_Y_F	'예'인 경우 가족관계_부
69	FHS_Y_M	'예'인 경우 가족관계_모

변수 번호	변수명	변수설명
70	FHS_Y_BS	'예'인 경우 가족관계_형제자매
71	FHS_Y_ETC	'예'인 경우 가족관계_방계(삼촌, 이모 등)
72	FHDPYN	우울증 가족력이 있습니까?
73	FHDPYN_Y_GF	'예'인 경우 가족관계_조부
74	FHDPYN_Y_GM	'예'인 경우 가족관계_조모
75	FHDPYN_Y_F	'예'인 경우 가족관계_부
76	FHDPYN_Y_M	'예'인 경우 가족관계_모
77	FHDPYN_Y_BS	'예'인 경우 가족관계_형제자매
78	FHDPYN_Y_ETC	'예'인 경우 가족관계_방계(삼촌, 이모 등)
79	FHOTHYN	우울증이 아닌 다른 정신과 질환의 가족력이 있습니까?
80	FHOTHYN_Y	'예'인 경우 가족관계
81	FHOTHYN_Y_NM	'예'인 경우 질환명
82	FHOTHYN_Y_NM_ MEDDRA_VER	MedDRA_Version
83	FHOTHYN_Y_NM_ LT_CODE	MedDRA_Lowest Level Term Code
84	FHOTHYN_Y_NM_ LT_NAME	MedDRA_Lowest Level Term
85	FHOTHYN_Y_NM_ P T_CODE	MedDRA_Preferred Term Code
86	FHOTHYN_Y_NM_ P T_NAME	MedDRA_Preferred Term
87	FHOTHYN_Y_NM_ HLT_CODE	MedDRA_High Level Term Code
88	FHOTHYN_Y_NM_ HLT_NAME	MedDRA_High Level Term
89	FHOTHYN_Y_NM_ HLGT_CODE	MedDRA_High Level Group Term Code
90	FHOTHYN_Y_NM_ HLGT_NAME	MedDRA_High Level Group Term
91	FHOTHYN_Y_NM_ S OC_CODE	MedDRA_System Organ Class Code
92	FHOTHYN_Y_NM_ S OC_NAME	MedDRA_System Organ Class
93	PHDYN	과거에 우울증 에피소드가 있었습니까?
94	PHDYN_YDT	'예'인 경우 첫 번째 에피소드 발생 시기
95	PHDYN_YCT	과거 총 에피소드 횟수(현재 것 제외)

변수 번호	변수명	변수설명
96	PHDHPYN	과거의 에피소드 발현 시 입원을 한 적이 있습니까?
97	PHDHPYN_YCT	'예'인 경우 입원 횟수
98	PHDSAYN	과거 자살 시도력이 있습니까?
99	PHDSAYN_Y	'예'인 경우 시도 횟수(2개월 내 자살시도력 포함)
100	CSYN	최근(2개월 이내) 자살시도에 관한 병력
101	CSA1	시도방법_음독
102	CSA2	시도방법_농약
103	CSA3	시도방법_목매
104	CSA4	시도방법_칼 등 날카로운 물질
105	CSA5	시도방법_투신/추락
106	CSA6	시도방법_교통수단
107	CSA7	시도방법_가스흡입
108	CSA8	시도방법_의사
109	CSA9	시도방법_미상
110	CSA10	시도방법_기타
111	CSP	자살시도 장소
112	CSP1	자살시도 장소_주택
113	CSP2	자살시도 장소_집단거주시설
114	CSP3	자살시도 장소_학교, 기타 시설 및 공공행정 구역
115	CSP4	자살시도 장소_운동 및 경기장
116	CSP5	자살시도 장소_도로 및 고속도로
117	CSP6	자살시도 장소_상업 및 서비스구역
118	CSP7	자살시도 장소_산업 및 건설지역
119	CSP8	자살시도 장소_농장
120	CSP9	자살시도 장소_기타 명시된 장소
121	CSP10	자살시도 장소_상세불명 장소
122	CSAYN	자살시도 당시 음주 여부
123	CSMT1	자살동기_가정문제
124	CSMT2	자살동기_경제생활 문제
125	CSMT3	자살동기_육체적 질병 문제
126	CSMT4	자살동기_정신적, 정신과적 문제
127	CSMT5	자살동기_직장 또는 업무상의 문제
128	CSMT6	자살동기_남녀문제
129	CSMT7	자살동기_사별문제
130	CSMT8	자살동기_학대 또는 폭력 문제
131	CSMT9	자살동기_기타

변수 번호	변수명	변수설명
132	CSMT10	자살동기_미상
133	CSMTA	자살동기_평가자 판단
134	CS1	1. [죽고 싶은 소망] 죽고 싶다거나 잠든 뒤 깨어나지 않았으면 좋겠다고 바란 적이 있습니까?
135	CS1_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.
136	CS2	2. [비특이성 적극적 자살 생각] 실제로 자살을 생각해본 적이 있습니까?
137	CS2_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.
138	CS3	3. [실행 의도가 없이 어떤 방법(계획이 아닌)들을 생각하는 적극적 자살 생각] 어떻게 실행에 옮길 지 생각해본 적이 있습니까?
139	CS3_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.
140	CS4	4. [구체적인 계획 없이, 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각] 이런 생각을 해 본 적이 있으며 실행할 의도가 어느 정도 있었습니까?
141	CS4_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.
142	CS5	5. [구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각] 자살 방법에 대해 자세하게 궁리하기 시작했거나 궁리한 적이 있습니까? 이 계획을 실행에 옮길 의도가 있습니까?
143	CS5_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.
144	CSS0	자살 생각의 유형
145	CSS0_ETC	자살 생각의 설명
146	CSS1	[빈도] 평소에 이런 생각을 몇 번이나 하셨습니까?
147	CSS2	[지속 시간] 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니까?
148	CSS3	[통제 가능성] 자신이 원할 경우 자살하거나 죽고 싶다는 생각을 중단할 수 있었습니까/있습니까?
149	CSS4	[저지 요인] 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가 (예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있습니까?
150	CSS5	[자살 생각의 이유] 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나 어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까?
151	CSSR1	[실제적 기도] 자살을 기도한 적이 있습니까? 자해를 하기 위해 무슨 일을 한 적이 있습니까? 무엇을 했습니까? 목숨을 끊기 위한 방법으로 ____을(를) 했습니까? ____했을 때 (조금이라도) 죽기를 원했습니까? ____했을 때 목숨을 끊으려고 했습니까? 혹은 ____으로 죽을 가능성이 있다는 생각을 했습니까? 혹은 순전히 다른 이유로 / 자살할 의도가 전혀 없이(예를 들면, 스트레스를 풀기 위해, 기분 전환을 위해, 동정심을 얻으려고, 또는 상황을 바꾸기 위해서) 그런 일을 했습니까? (자살 의도가 없는 자해 행동)

변수 번호	변수명	변수설명
152	CSSR1_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.
153	CSSR1_Y_CNT	총 기도 수
154	CSSR2	피험자는 비자살적 자해 행동을 했습니까?
155	CSSR3	[방해된 기도] 목숨을 끊기 위해 무엇인가를 시작했지만 실제로 실행하기 전에 누군가에 의해 또는 무슨 일로 중단된 때가 있습니까?
156	CSSR3_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.
157	CSSR3_Y_CNT	총 방해된 기도 수
158	CSSR4	[중단된 기도] 목숨을 끊으려고 무슨 일을 시작했지만 실제로 행하기 전에 스스로 중단한 때가 있습니까?
159	CSSR4_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.
160	CSSR4_Y_CNT	총 중단된 기도 수
161	CSSR5	[준비 행위나 행동] 자살을 기도하거나 자살을 준비하기 위한 행동(즉, 약물 수집, 총기 구입, 소중한 물건 나눠주기, 자살 메모 적기)을 취한 적이 있습니까?
162	CSSR5_Y	'예'인 경우, 설명하십시오.
163	CSSRS6	[자살 행동] 평가 기간 동안 자살 행동이 있었다
164	CSSRSDT1	가장 최근에 발생한 기도 날짜
165	CSSRSDT2	가장 치명적인 기도 날짜
166	CSSRSDT3	최초의 기도 날짜
167	CSSRSCD1	가장 최근에 발생한 기도날짜_코드입력1
168	CSSRSCD2	가장 치명적인 기도날짜_코드입력2
169	CSSRSCD3	최초의 기도 날짜_코드입력3
170	CSSRSCD4	가장 최근에 발행한 기도 날짜_코드입력4
171	CSSRSCD5	가장 치명적인 기도 날짜_코드입력5
172	CSSRSCD6	최초의 기도 날짜_코드입력6
173	CS1_1	1. [죽고 싶은 소망] 죽고 싶다거나 잠든 뒤 깨어나지 않았으면 좋겠다고 바란 적이 있습니까?
174	CS1_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.
175	CS2_1	2. [비특이성 적극적 자살 생각] 실제로 자살을 생각해본 적이 있습니까?
176	CS2_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.
177	CS3_1	3. [실행 의도가 없이 어떤 방법(계획이 아닌)들을 생각하는 적극적 자살 생각] 어떻게 실행에 옮길 지 생각해본 적이 있습니까?
178	CS3_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.
179	CS4_1	4. [구체적인 계획 없이, 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각] 이런 생각을 해 본 적이 있으며 실행할 의도가 어느 정도 있었습니까?
180	CS4_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.

변수 번호	변수명	변수설명
181	CS5_1	5. [구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각] 자살 방법에 대해 자세하게 궁리하기 시작했거나 궁리한 적이 있습니까? 이 계획을 실행에 옮길 의도가 있습니까?
182	CS5_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.
183	CSS0_1	자살 생각의 유형
184	CSS0_ETC_1	자살 생각의 설명
185	CSS1_1	[빈도] 평소에 이런 생각을 몇 번이나 하셨습니까?
186	CSS2_1	[지속 시간] 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니까?
187	CSS3_1	[통제 가능성] 자신이 원할 경우 자살하거나 죽고 싶다는 생각을 중단할 수 있었습니까/있습니까?
188	CSS4_1	[저지 요인] 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가 (예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있습니까?
189	CSS5_1	[자살 생각의 이유] 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나 어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까?
190	CSSR1_1	[실제적 기도] 자살을 기도한 적이 있습니까? 자해를 하기 위해 무슨 일을 한 적이 있습니까? 무엇을 했습니까? 목숨을 끊기 위한 방법으로 _____을(를) 했습니까? _____했을 때 (조금이라도) 죽기를 원했습니까? _____했을 때 목숨을 끊으려고 했습니까? 혹은 _____으로 죽을 가능성이 있다는 생각을 했습니까? 혹은 순전히 다른 이유로 / 자살할 의도가 전혀 없이(예를 들면, 스트레스를 풀기 위해, 기분 전환을 위해, 동정심을 얻으려고, 또는 상황을 바꾸기 위해서) 그런 일을 했습니까? (자살 의도가 없는 자해 행동)
191	CSSR1_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.
192	CSSR1_Y_CNT_1	총 기도 수
193	CSSR2_1	피험자는 비자살적 자해 행동을 했습니까?
194	CSSR3_1	[방해된 기도] 목숨을 끊기 위해 무엇인가를 시작했지만 실제로 실행하기 전에 누군가에 의해 또는 무슨 일로 중단된 때가 있습니까?
195	CSSR3_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.
196	CSSR3_Y_CNT_1	총 방해된 기도 수
197	CSSR4_1	[중단된 기도] 목숨을 끊으려고 무슨 일을 시작했지만 실제로 행하기 전에 스스로 중단한 때가 있습니까?
198	CSSR4_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.
199	CSSR4_Y_CNT_1	총 중단된 기도 수
200	CSSR5_1	[준비 행위나 행동] 자살을 기도하거나 자살을 준비하기 위한 행동(즉, 약물 수집, 총기 구입, 소중한 물건 나눠주기, 자살 메모 적기)을 취한 적이 있습니까?

변수 번호	변수명	변수설명
201	CSSR5_Y_1	'예'인 경우, 설명하십시오.
202	CSSRS6_1	[자살 행동] 평가 기간 동안 자살 행동이 있었다
203	CSSRSDT2_1	가장 치명적인 기도 날짜
204	CSSRSCD2_1	가장 치명적인 기도날짜_코드입력2
205	CSSRSCD5_1	가장 치명적인 기도 날짜_코드입력5
206	CSSRS7_1	완료된 자살
207	SISND	SIS ND
208	SISTO	Total
209	SISP1SUB	Part 1(circumstances) subtotal
210	SISP2SUB	Part 2(self-report) subtotal
211	SISP1_1	1. 고립
212	SISP1_2	2. 시간
213	SISP1_3	3. 발견/개입에 대한 경계
214	SISP1_4	4. 시도하는 동안 또는 시도 후 도움을 요청하는 행동(적용불가)
215	SISP1_5	5. 죽음 준비행동
216	SISP1_6	6. 자살시도 계획정도
217	SISP1_7	7. 유서
218	SISP1_8	8. 자살시도 전에 자살의도에 대한 표현
219	SISP2_1	1. 자살시도의 목적
220	SISP2_2	2. 치명적인 행동과 관련된 기대
221	SISP2_3	3. 방법의 치명성에 대한 생각
222	SISP2_4	4. 자살시도의 심각성
223	SISP2_5	5. 삶에 대한 양가적 생각
224	SISP2_6	6. 회복에 대한 생각
225	SISP2_7	7. 사전고려의 정도
226	21IHD1	1. Depression mood (sadness, hopeless, worthless)
227	21IHD2	2. Feeling of guilty
228	21IHD3	3. Suicide
229	21IHD4	4. Insomnia early
230	21IHD5	5. Insomnia middle
231	21IHD6	6. Insomnia late
232	21IHD7	7. Work and activities
233	21IHD8	8. Retardation
234	21IHD9	9. Agitation
235	21IHD10	10. Anxiety psychic
236	21IHD11	11. Anxiety somatic

변수 번호	변수명	변수설명
237	21IHD12	12. Somatic symptoms gastrointestinal
238	21IHD13	13. Somatic symptoms general
239	21IHD14	14. Genital symptoms
240	21IHD15	15. Hypochondriasis
241	21IHD16	16. Loss of weight
242	21IHD17	17. Insight
243	21IHD18	18. Diurnal variation
244	21IHD19	19. Depersonalization and derealization
245	21IHD20	20. Paranoid symptom
246	21IHD21	21. Obsession and compulsion
247	21IHDTO	총점 (TOTAL SCORE)
248	BSSI1	1. 살고 싶은 소망이 있나요?
249	BSSI2	2. 죽고 싶은 소망이 있나요?
250	BSSI3	3. 살고 싶은 이유 / 죽고 싶은 이유는 무엇인가요?
251	BSSI4	4. 실제로 자살시도를 하려는 욕구가 있나요?
252	BSSI5	5. 별로 적극적이지 않고 수동적인 자살 욕구가 생길 때는 어떻게 할 것인가요?
253	BSSI6	6. 자살하고 싶은 생각이나 소망이 얼마나 오랫동안 지속되나요?
254	BSSI7	7. 얼마나 자주 자살하고 싶은 생각이 드나요?
255	BSSI8	8. 자살생각이나 소망에 대한 귀하의 태도는 어떤가요?
256	BSSI9	9. 자살하고 싶은 충동을 통제할 수 있나요?
257	BSSI10	10. 자살시도에 대한 방해물이 있다면 어떻게 할 것인가요? (예:가족, 종교, 다시 살 수 없다는 생각 등)
258	BSSI11	11. 자살에 대해 깊게 생각해 본 이유는 무엇인가요?
259	BSSI12	12. 자살에 대해 깊게 생각 했을 때 구체적인 방법까지 계획 했나요?
260	BSSI13	13. 자살 방법을 깊게 생각 했다면 그것이 얼마나 현실적으로 실현 가능하며, 또한 시도할 기회가 있다고 생각하나요?
261	BSSI14	14. 실제로 자살할 수 있는 능력이 있다고 생각하나요?
262	BSSI15	15. 정말로 자살 시도를 할 것이라고 확신하나요?
263	BSSI16	16. 자살에 대한 생각을 실행하기 위해 실제로 준비한 것이 있나요?
264	BSSI17	17. 자살하려는 글(유서)을 쓴 적이 있나요?
265	BSSI18	18. 죽음을 예상하고 마지막 정리를 한 적 있나요? (예 : 보험, 유언 등)
266	BSSI19	19. 자살에 대한 생각을 다른 사람들에게 이야기한 적이 있습니까, 혹은 속이거나 숨겼습니까?
267	BSSITO	총점
268	GADTOT	총점

변수 번호	변수명	변수설명
269	GAD1	1. 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다
270	GAD2	2. 걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다
271	GAD3	3. 여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다
272	GAD4	4. 편하게 있기가 어렵다
273	GAD5	5. 너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다
274	GAD6	6. 쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다
275	GAD7	7. 마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다
276	KBIS1	1. 나는 일을 시작하기 전에 세밀하게 계획을 세운다.
277	KBIS2	2. 나는 깊이 생각하지 않고 일을 한다.
278	KBIS3	3. 나는 결정을 빨리 내리는 편이다.
279	KBIS4	4. 나는 낙천적인 사람이다.
280	KBIS5	5. 나는 집중을 잘 못한다.
281	KBIS6	6. 나는 온갖 생각을 쉬지 않고 떠올린다.
282	KBIS7	7. 나는 여행을 떠나기 전에 세밀하게 계획을 세운다.
283	KBIS8	8. 나는 자제력이 있는 편이다.
284	KBIS9	9. 나는 어떤 일든지 쉽게 집중할 수 있다.
285	KBIS10	10. 나는 꾸준히 저축을 한다.
286	KBIS11	11. 나는 일(공부)할 때나 놀 때 잠시도 몸을 가만히 두지 못한다.
287	KBIS12	12. 나는 주의깊게 생각하는 사람이다.
288	KBIS13	13. 나는 안정된 직장(학교) 생활을 유지하려 애쓴다.
289	KBIS14	14. 나는 깊이 생각하지 않고 말을 한다.
290	KBIS15	15. 나는 복잡한 문제를 놓고 생각하는 것을 좋아한다.
291	KBIS16	16. 나는 직장(학교나 학원 등)을 옮겨 다닌다.
292	KBIS17	17. 나는 충동적으로 행동한다.
293	KBIS18	18. 나는 복잡한 문제에 대해 생각하려고 하면 곧 싫증이 난다.
294	KBIS19	19. 나는 즉흥적으로 생각한다.
295	KBIS20	20. 나는 골똘히 생각하는 편이다.
296	KBIS21	21. 나는 자주 이사다니는 편이다.
297	KBIS22	22. 나는 충동구매를 하곤 한다.
298	KBIS23	23. 나는 한번에 하나씩만 생각한다.
299	KBIS24	24. 나는 취미가 자주 바뀐다.
300	KBIS25	25. 나는 버는 것 이상으로 돈을 쓰는 편이다.
301	KBIS26	26. 나는 종종 주제와 관계없는 생각들을 하곤 한다.
302	KBIS27	27. 나는 미래보다는 현재에 더 관심이 있다.
303	KBIS28	28. 나는 영화를 보거나 강의를 들을 때 가만히 앉아 있지 못한다.
304	KBIS29	29. 나는 어려운 문제 푸는 것을 좋아한다.

변수 번호	변수명	변수설명
305	KBIS30	30. 나는 미래 지향적인 사람이다.
306	KBISTOT	총점
307	UCLA1	1. 얼마나 자주 주변 사람들과 잘 통한다고 느끼십니까?
308	UCLA2	2. 얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?
309	UCLA3	3. 얼마나 자주 도움을 청할 사람이 아무도 없다고 느끼십니까?
310	UCLA4	4. 얼마나 자주 혼자라고 느끼십니까?
311	UCLA5	5. 얼마나 자주 친구들 모임에 속해 있다고 느끼십니까?
312	UCLA6	6. 얼마나 자주 당신 주위사람들과 비슷한 점이 많다고 느끼십니까?
313	UCLA7	7. 얼마나 자주 당신이 더 이상 아무하고도 가깝지 않다고 느끼십니까?
314	UCLA8	8. 얼마나 자주 당신의 흥미와 생각들이 주변사람과 나누어지지 않는다고 느끼십니까?
315	UCLA9	9. 얼마나 자주 자신이 적극적이고 호의적이라고 느끼십니까?
316	UCLA10	10. 얼마나 자주 사람들과 가깝다고 느끼십니까?
317	UCLA11	11. 얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까?
318	UCLA12	12. 얼마나 자주 다른 사람들과의 관계가 의미 없다고 느끼십니까?
319	UCLA13	13. 얼마나 자주 당신을 진정으로 아는 사람이 아무도 없다고 느끼십니까?
320	UCLA14	14. 얼마나 자주 다른 사람들로 부터 고립되어 있다고 느끼십니까?
321	UCLA15	15. 얼마나 자주 당신이 원할 때에 함께 있어줄 사람을 찾을수 있다고 느끼십니까?
322	UCLA16	16. 얼마나 자주 당신을 정말 이해해 주는 사람들이 있다고 느끼십니까?
323	UCLA17	17. 얼마나 자주 수줍음을 느끼십니까?
324	UCLA18	18. 얼마나 자주 사람들이 당신과 진정으로 함께 있지 않고 그저 주위에 있는 것이라고 느끼십니까?
325	UCLA19	19. 얼마나 자주 당신이 얘기할 수 있는 사람들이 주변에 있다고 생각합니까?
326	UCLA20	20. 얼마나 자주 당신이 도움을 청할 수 있는 사람들이 있다고 느끼십니까?
327	UCLATOT	총점
328	EQ5D1	운동 능력
329	EQ5D2	자기 관리
330	EQ5D3	일상 행동(예 : 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)
331	EQ5D4	통증/불편
332	EQ5D5	불안/우울
333	VAS	오늘의 건강 상태
334	CSRI1	1. 지난 1개월동안 다음 서비스를 이용했습니까?
335	CSRI1_1	서비스 유형

변수 번호	변수명	변수설명
336	CSRI1_2	횟수
337	CSRI1_3	서비스 유형
338	CSRI1_4	진료과목
339	CSRI1_5	일
340	CSRI2	2. 지난 1개월간 건강상태 때문에 며칠동안 휴가(병가)를 냈습니까?
341	CSRI3	3. 지난 1개월간 정신건강복지센터를 몇 번 방문하셨습니다?
342	CSRI4	4. 지난 1개월간 다른 지역사회기반 서비스를 이용하셨습니다?
343	CSRI4_1	지역사회 기반서비스의 명칭 (민간운영)
344	CSRI4_2	횟수
345	CSRI4_3	비용(1개월)
346	CSRI5	5. 지난 1개월간 건강보조식품을 복용하였습니까?
347	CSRI5_1_CNT	오메가-3 (피쉬오일)_횟수
348	CSRI5_1_CT	오메가-3 (피쉬오일)_비용
349	CSRI5_2_CNT	유산균(프로바이오틱스)/프리바이오틱스_횟수
350	CSRI5_2_CT	유산균(프로바이오틱스)/프리바이오틱스_비용
351	CSRI5_3_CNT	비타민/미네랄_횟수
352	CSRI5_3_CT	비타민/미네랄_비용
353	CSRI5_4_CNT	약초약물/허브차 (예: 세인트존스워트, 홍삼, 강황, 녹차 등)_횟수
354	CSRI5_4_CT	약초약물/허브차 (예: 세인트존스워트, 홍삼, 강황, 녹차 등)_비용
355	CSRI5_5_NM	기타_건강보조식품종류
356	CSRI5_5_CNT	기타_횟수 (병당, 팩당 등.)
357	CSRI5_5_CT	기타_단위당 비용
358	CSRI6	6. 병원을 방문하는데 소요되는 편도시간: 건강 및 사회복지전문가들을 만나기 위해 편도이동에 소요된 평균시간을 말씀해 주십시오
359	CSRI7	7. 병원 방문시/ 건강 및 사회복지전문가들을 만나기 위해 편도이동에 따른 금액을 말씀해 주십시오.
360	CSRI8_1	8-1 혼자 거주하십니까?
361	CSRI8_2	8-2 만일 당신이 개/고양이와 같은 애완동물을 키우신다면, 1개월동안 애완동물을 위해 얼마를 쓰십니까?
362	CSRI9	9. 일상생활에 도움을 준 사람은 누구입니까?(예: 요리, 청소, 쇼핑, 운전, 은행일/비용 지불, 감독/관찰 등) 다음중 하나를 선택해 주세요.
363	CSRI10_1	1) 만일 그렇다면, 일주일에 몇 시간동안 당신을 도와/돌보아 주었나요?
364	CSRI10_2	2) 지난 1개월동안 당신을 돌보거나 방문하기 위해 보호자가 일을 줄이거나 직장을 쉬었습니까?
365	TRTYN	치료 중단 여부
366	TRTCA	치료순응도
367	APPDT	외래 예약일

변수 번호	변수명	변수설명
368	APPDT_ND	외래예약 ND
369	DTYN	방문여부(O,X)
370	TRTDT	실제 외래 진료일
371	SLEYN	지난 방문 이후 스트레스가 될 만한 안 좋은 생활 사건이 있었나요?
372	SLEY_ETC	'예'인 경우, 그 내용을 적으시오
373	SLEEF	그 생활사건이 환자의 생활에 얼마나 큰 영향을 주었습니까?
374	SAYN	지난 방문 이후 자살 시도가 발생하였습니까?
375	TRDTTOT	총 외래방문 횟수
376	V3_ACMYN	지난 방문 이후 사례관리 서비스를 시행 하였습니까?
377	V3_ACMTYPE	상담유형
378	V3_ACMFAM	상담대상
379	V3_ACMDT	상담일자
380	V3_ACMTM	상담소요시간
381	V3_ACMTOT	상담 총 횟수
382	V3_ACMUNT	비대면 상담(전화/특)
383	V3_ACMETC	기타(문자메시지/앱메시지)
384	V3_ACMPRM	교육 및 프로그램(환자/가족 모두 포함)
385	V3_ACMSRV	서비스 연계 및 모니터링(대면/비대면 면담 모두 포함)
386	V3_PRSTF	제공받은 서비스 전반에 대해 만족하는 편이다.
387	V4_ACNYN	지난 방문 이후 사례관리 서비스를 시행 하였습니까?
388	V4_ACMTYPE	상담유형
389	V4_ACMFAM	상담대상
390	V4_ACMDT	상담일자
391	V4_ACMTM	상담시간
392	V4_ACMTOT	상담 총 횟수
393	V4_ACMUNT	비대면 상담(전화/문자/특)
394	V4_ACMETC	기타(문자메시지/앱메시지)
395	V4_ACMPRM	교육 및 프로그램(환자/가족 모두 포함)
396	V4_ACMSRV	서비스 연계 및 모니터링(대면/비대면 면담 모두 포함)
397	V4_PRSTF	제공받은 서비스 전반에 대해 만족하는 편이다.
398	V5_ACMYN	지난 방문 이후 사례관리 서비스를 시행 하였습니까?
399	V5_ACMTYPE	상담유형
400	V5_ACMFAM	상담대상
401	V5_ACMDT	상담일자
402	V5_ACMTM	상담시간
403	V5_ACMTOT	상담 총 횟수

변수 번호	변수명	변수설명
404	V5_ACMUNT	비대면 상담(전화/문자/톡)
405	V5_ACMETC	기타(문자메시지/앱메시지)
406	V5_ACMPRM	교육 및 프로그램(환자/가족 모두 포함)
407	V5_ACMSRV	서비스 연계 및 모니터링(대면/비대면 면담 모두 포함)
408	V5_PRSTF	제공받은 서비스 전반에 대해 만족하는 편이다.
409	V6_ACMYN	지난 방문 이후 사례관리 서비스를 시행 하였습니까?
410	V6_ACMTYPE	상담유형
411	V6_ACMFAM	상담대상
412	V6_ACMDT	상담일자
413	V6_ACMTM	상담시간
414	V6_ACMTOT	상담 총 횟수
415	V6_ACMUNT	비대면 상담(전화/문자/톡)
416	V6_ACMETC	기타(문자메시지/앱메시지)
417	V6_ACMPRM	교육 및 프로그램(환자/가족 모두 포함)
418	V6_ACMSRV	서비스 연계 및 모니터링(대면/비대면 면담 모두 포함)
419	V6_PRSTF	제공받은 서비스 전반에 대해 만족하는 편이다.
420	CMYN	등록일 이후 우울증 및 자살 충동과 관련하여 함께 투여된 약물이 있습니까?
421	CMNM	약물명
422	CMNM_대표코드	대표코드
423	CMNM_업체명	업체명
424	CMNM_ATC_CODE	ATC_Code
425	CMNMETC	약물명_기타
426	CMAR	투여 경로
427	CMDOSE	1일 투여량
428	CMSDT	투여시작일
429	CMEDT	투여종료일
430	CMING	지속여부
431	CMSTP	중지사유
432	SEDT	연구 종결일
433	SESPDT	연구 중단 사유 발생일
434	SEND	연구 종료 현황
435	SECA	연구 중도 탈락 사유
436	SECA_ETC	연구 중도 탈락 사유_기타
437	PICONFIRM	연구자 서명
438	PIDT	연구자 서명일

IV. 부록

1. 연구대상자 선정·제외기준

선정기준		제외기준	
1	만 18세 이상의 성인 남녀	1	등록 시점에서 시험대상자의 긴박한 자살 위험으로 인해 급성정신과 입원이 임상적으로 필요한 경우로 의사가 판단한 경우
2	연구등록 1개월 내에 자살의도를 가진 자살사고 또는 2개월 내에 자살을 시도한 병력이 있으며 주요 우울증의 진단 및 통계 편람 (제5판) (DSM-5) 진단 기준을 반드시 충족하고, 임상평가를 토대로 하고 국제 신경정신과 면담(MINI)에 의해 확인된 정신병적 소견이 없는 자	2	현재 경계성 인격 장애 등 DSM-5 기준에 따른 2축 진단기준을 충족하는 경우
3	연구 참여를 스스로 결정할 수 있는 동의능력이 있는 자	3	자폐증, 치매, 또는 지적 장애의 현재 임상적 진단이 있는 경우
4	※ 참고 : 집중사례관리 서비스 이용을 위해 스마트폰 앱/웹 사용이 가능해야 한다.	4	니코틴 또는 카페인을 제외하고, 스크리닝 전 6개월 이내에 DSM-5 기준에 따라 중등증 내지 중증의 물질 또는 알코올 사용 장애의 과거력이 있는 경우
		5	기타 연구자가 연구 참여에 부적합하다고 판단한 경우

2. 주요 선행연구 목록

번호	논문명	주저자명	서지정보
1	해당없음		
2			
3			
4			

3. Annotated CRF

도메인명(eCRF 명)		방문1_환자선정방문(Screening)					
		VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
방문1	YYYY-MM-DD (VISIT1)						
선정기준	만 18세 이상의 성인 남녀 (IN1)	<input type="checkbox"/> 예 (IN1=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (IN1=2)					
	연구 등록 1개월 내에 자살의도를 가진 자살사고 또는 2개월 내에 자살을 시도한 병력이 있으며 주요 우울증의 진단 및 통계 편람 (제 5판) (DSM-5) 진단 기준을 충족하고, 임상 평가를 토대로 간이 국제 신경정신과 면담 (MINI)에 의해 확인된 정신병적 소견이 없는 자 (IN2)	<input type="checkbox"/> 예 (IN2=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (IN2=2)					
	연구 참여를 스스로 결정할 수 있는 동의 능력이 있는 자 (IN3)	<input type="checkbox"/> 예 (IN3=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (IN3=2)					
	제외기준	<input type="checkbox"/> 예 (EX1=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (EX1=2)					
등록시점에서 시험대상자의 긴박한 자살 위험으로 인해 급성 정신과 입원이 임상적으로 필요한 경우로 의사가 판단한 경우 (EX1)	<input type="checkbox"/> 예 (EX2=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (EX2=2)						
현재 경계성 인격 장애 등 DSM-5 기준에 따른 2축 진단기준을 충족하는 경우 (EX2)	<input type="checkbox"/> 예 (EX3=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (EX3=2)						
자폐증, 치매, 또는 지적 장애의 현재 임상적 진단이 있는 경우 (EX3)	<input type="checkbox"/> 예 (EX4=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (EX4=2)						
니코틴 또는 카페인을 제외하고, 스크리닝 전 6개월 이내에 DSM-5 기준에 따라 중증등 내지 중증의 물질 또는 알코올 사용 장애의 과거력이 있는 경우 (EX4)	<input type="checkbox"/> 예 (EX5=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (EX5=2)						
기타 연구자가 연구 참여에 부적합하다고 판단한 경우 (EX5)							

도메인명(eCRF 명)	피험자 기초 정보 (Sociodemographic Data)
--------------	-----------------------------------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

혼인상태	<input type="checkbox"/> 미혼 (SD1=1)	
	<input type="checkbox"/> 기혼 (SD1=2)	
	<input type="checkbox"/> 동거 (SD1=3)	
	<input type="checkbox"/> 별거 (SD1=4)	
	<input type="checkbox"/> 이혼 (SD1=5)	
	<input type="checkbox"/> 사별 (SD1=6)	
	<input type="checkbox"/> 기타 (SD1=7)	
가족관계	부 (SD3F)	<input type="checkbox"/> 생존 (SD3F=1) <input type="checkbox"/> 사망 (SD3F=2)
	모 (SD3M)	<input type="checkbox"/> 생존 (SD3M=1) <input type="checkbox"/> 사망 (SD3M=2)
	형제자매 (SD3BS)	남__명, 여__명 (본인포함) 중 __째
	자녀 (SD3K)	남__명, 여__명
학력	__년 (SD4)	
종교	<input type="checkbox"/> 없음 (SD5=1)	
	<input type="checkbox"/> 있음 (SD5=2)	
의료보장	<input type="checkbox"/> 지역건강보험 (SD6=1)	
	<input type="checkbox"/> 직장건강보험 (SD6=2)	
	<input type="checkbox"/> 의료급여 1종 (SD6=3)	
	<input type="checkbox"/> 의료급여 2종 (SD6=4)	
	<input type="checkbox"/> 기타 (SD6=5)	
직업	<input type="checkbox"/> 무직 (SD7=1)	
	<input type="checkbox"/> 학생 (SD7=2)	
	<input type="checkbox"/> 주부 (SD7=3)	
	<input type="checkbox"/> 전문직 (SD7=4)	
	<input type="checkbox"/> 사무직 (SD7=5)	
	<input type="checkbox"/> 서비스직 (SD7=6)	
	<input type="checkbox"/> 판매직 (SD7=7)	
	<input type="checkbox"/> 농어민 (SD7=8)	
	<input type="checkbox"/> 군인 (SD7=9)	
	<input type="checkbox"/> 단순노무직 (SD7=10)	
	<input type="checkbox"/> 기술직 (SD7=11)	
	<input type="checkbox"/> 기타 (SD7=12)	
월평균소득	<input type="checkbox"/> 50만원 이하 (SD8=1)	
	<input type="checkbox"/> 51-100만원 (SD8=2)	
	<input type="checkbox"/> 101-150만원 (SD8=3)	
	<input type="checkbox"/> 151-200만원 (SD8=4)	
	<input type="checkbox"/> 201-250만원 (SD8=5)	
	<input type="checkbox"/> 251-300만원 (SD8=6)	
	<input type="checkbox"/> 301만원 이상 (SD8=7)	

신체병력	유무	<input type="checkbox"/> 유 (SD9YN=1)	
		<input type="checkbox"/> 무 (SD9YN=2)	
	질병명	(SD9YN_NM)	
	MedDRA_Version	26.1 (SD9YN_NM_MEDDRA_VER)	
	MedDRA_Lowest Level Term Code	(SD9YN_NM_LLT_CODE)	
	MedDRA_Lowest Level Term	(SD9YN_NM_LLT_NAME)	
	MedDRA_Preferred Term Code	(SD9YN_NM_PT_CODE)	
	MedDRA_Preferred Term	(SD9YN_NM_PT_NAME)	
	MedDRA_High Level Term Code	(SD9YN_NM_HLT_CODE)	
	MedDRA_High Level Term	(SD9YN_NM_HLT_NAME)	
	MedDRA_High Level Group Term Code	(SD9YN_NM_HLGT_CODE)	
	MedDRA_High Level Group Term	(SD9YN_NM_HLGT_NAME)	
	MedDRA_System Organ Class Code	(SD9YN_NM_SOC_CODE)	
	MedDRA_System Organ Class	(SD9YN_NM_SOC_NAME)	
	현재 지속 여부	<input type="checkbox"/> 예 (SD9YN_ING=1)	
	<input type="checkbox"/> 아니오 (SD9YN_ING=2)		
중증도		<input type="checkbox"/> 경증 (SD9YN_SEV=1)	
		<input type="checkbox"/> 중등증 (SD9YN_SEV=2)	
		<input type="checkbox"/> 중증 (SD9YN_SEV=3)	
음주력	평소 음주여부	<input type="checkbox"/> 예 (SD10YN=1)	
		<input type="checkbox"/> 아니오 (SD10YN=2)	
	음주횟수		<input type="checkbox"/> 한달에 한번 미만 (SD11CNT=1)
			<input type="checkbox"/> 월 2-4회 (SD11CNT=2)
			<input type="checkbox"/> 주 2-3회 (SD11CNT=3)
			<input type="checkbox"/> 주 4회 이상 (SD11CNT=4)
	1회 음주량		<input type="checkbox"/> 1-2잔 (SD11VL=1)
			<input type="checkbox"/> 3-4잔 (SD11VL=2)
			<input type="checkbox"/> 5-6잔 (SD11VL=3)
			<input type="checkbox"/> 7-9잔 (SD11VL=4)
		<input type="checkbox"/> 10잔 이상 (SD11VL=5)	
동거인	동거인 모두 선택	<input type="checkbox"/> 없음 (SD2_1=1)	
		<input type="checkbox"/> 배우자 (SD2_2=1)	
		<input type="checkbox"/> 자녀 (SD2_3=1)	
		<input type="checkbox"/> 부 (SD2_4=1)	
		<input type="checkbox"/> 모 (SD2_5=1)	
		<input type="checkbox"/> 조부 (SD2_6=1)	
		<input type="checkbox"/> 조모 (SD2_7=1)	
		<input type="checkbox"/> 친구/동료 (SD2_8=1)	
<input type="checkbox"/> 기타 (SD2_9=1)			

도메인명(eCRF 명)	현재 우울증 발현에 대한 병력 (Current Major Depressive Episode)
--------------	---

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

현재의 에피소드가 시작된 날짜	YYYY-MM-DD (DPSDT)					
현재의 에피소드로 인해 입원을 하였습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (DPADYN=1)					
	<input type="checkbox"/> 아니오 (DPADYN=2)					
생활사건 (Stressful Life Event)	현재의 에피소드가 있기 전 확인 가능한 스트레스가 될 만한 안 좋은 생활 사건이 있었나요?		<input type="checkbox"/> 예 (DPSEYN=1)			
			<input type="checkbox"/> 아니오 (DPSEYN=2)			
	'예' 인 경우, 그 내용을 적으시오.		_____ (DPSEY_ETC)			
	그 생활사건이 환자의 생활에 얼마나 큰 영향을 주었습니까? (직접 물어볼 것)		<input type="checkbox"/> 전혀 영향 없었음 (DPSEE=1)			
			<input type="checkbox"/> 약간 영향 (DPSEE=2)			
		<input type="checkbox"/> 중등도 영향 (DPSEE=3)				
		<input type="checkbox"/> 심각한 영향 (DPSEE=4)				
현재 정신과 치료 및 약물 복용 여부	현재의 에피소드에 대한 정신과 치료		<input type="checkbox"/> 현재 치료중 (DPTM=1)			
			<input type="checkbox"/> 치료받지 않음 (DPTM=2)			
			<input type="checkbox"/> 치료 중단 (DPTM=3)			
	현재의 에피소드에 대해 투여된 약물이 있습니까?(최근 3개월 이내)		<input type="checkbox"/> 예 (DPTMYN=1)			
			<input type="checkbox"/> 아니오 (DPTMYN=2)			
	예인 경우	약물명(성분명)	_____ (DPTMNM)			
		대표코드	(DPTMNM_대표코드)			
		업체명	(DPTMNM_업체명)			
		ATC_Code	(DPTMNM_ATC_CODE)			
		ATC_Name	(DPTMNM_E)			
		투여경로	<input type="checkbox"/> per oral(PO) (DPTMRT=1)			
			<input type="checkbox"/> Intravenous(IV) (DPTMRT=2)			
			<input type="checkbox"/> Intramuscular(IM) (DPTMRT=3)			
			<input type="checkbox"/> Subcutaneous(SC) (DPTMRT=4)			
			<input type="checkbox"/> Sublingual(SL) (DPTMRT=5)			
<input type="checkbox"/> 기타 (DPTMRT=6)						
1일 투여량		____(mg/tb/T 등 단위 포함) (DPTMDO)				
투여기간_시작일		YYYY-MM-DD (DPTMST)				
투여기간_종료일		YYYY-MM-DD (DPTMEN)				
투여기간_지속여부	<input type="checkbox"/> 투여 지속중 (DPTMING=1)					
중지사유	<input type="checkbox"/> 효과 결여 (DPTMSTOP=1)					
	<input type="checkbox"/> 복약순응도 결여 (DPTMSTOP=2)					
	<input type="checkbox"/> 내약성 결여 (DPTMSTOP=3)					
	<input type="checkbox"/> 치료 완료 (DPTMSTOP=4)					
	<input type="checkbox"/> 기타 (DPTMSTOP=5)					

도메인명(eCRF 명)	가족력 (Family History)
--------------	----------------------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

자살 가족력	자살 가족력이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (FHSYN=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (FHSYN=1)
	'예'인 경우 가족관계 모두 선택	<input type="checkbox"/> 조부 (FHS_Y_GF=1)
		<input type="checkbox"/> 조모 (FHS_Y_GM=1)
		<input type="checkbox"/> 부 (FHS_Y_F=1)
		<input type="checkbox"/> 모 (FHS_Y_M=1)
		<input type="checkbox"/> 형제자매 (FHS_Y_BS=1)
<input type="checkbox"/> 방계(삼촌, 이모 등) (FHS_Y_ETC=1)		
우울증 가족력	우울증 가족력이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (FHDPYN=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (FHDPYN=2)
	'예'인 경우 가족관계 모두 선택	<input type="checkbox"/> 조부 (FHDPYN_Y_GF=1)
		<input type="checkbox"/> 조모 (FHDPYN_Y_GM=1)
		<input type="checkbox"/> 부 (FHDPYN_Y_F=1)
		<input type="checkbox"/> 모 (FHDPYN_Y_M=1)
		<input type="checkbox"/> 형제자매 (FHDPYN_Y_BS=1)
<input type="checkbox"/> 방계(삼촌, 이모 등) (FHDPYN_Y_ETC=1)		
우울증이 아닌 다른 정신과 질환 가족력	우울증이 아닌 다른 정신과 질환의 가족력이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (FHOTHYN=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (FHOTHYN=2)
	'예'인 경우 가족관계 모두 선택	<input type="checkbox"/> 조부 (FHOTHYN_Y=1)
		<input type="checkbox"/> 조모 (FHOTHYN_Y=2)
		<input type="checkbox"/> 부 (FHOTHYN_Y=3)
		<input type="checkbox"/> 모 (FHOTHYN_Y=4)
		<input type="checkbox"/> 형제자매 (FHOTHYN_Y=5)
	<input type="checkbox"/> 방계(삼촌, 이모 등) (FHOTHYN_Y=6)	
	'예'인 경우 질환명	(FHOTHYN_Y_NM)
	MedDRA_Version	26.1 (FHOTHYN_Y_NM_MEDDRA_VER)
	MedDRA_Lowest Level Term Code	(FHOTHYN_Y_NM_LL_T_CODE)
	MedDRA_Lowest Level Term	(FHOTHYN_Y_NM_LL_T_NAME)
	MedDRA_Preferred Term Code	(FHOTHYN_Y_NM_PT_CODE)
	MedDRA_Preferred Term	(FHOTHYN_Y_NM_PT_NAME)
	MedDRA_High Level Term Code	(FHOTHYN_Y_NM_HLT_CODE)
MedDRA_High Level Term	(FHOTHYN_Y_NM_HLT_NAME)	
MedDRA_High Level Group Term Code	(FHOTHYN_Y_NM_HLGT_CODE)	
MedDRA_High Level Group Term	(FHOTHYN_Y_NM_HLGT_NAME)	
MedDRA_System Organ Class Code	(FHOTHYN_Y_NM_SOC_CODE)	
MedDRA_System Organ Class	(FHOTHYN_Y_NM_SOC_NAME)	

도메인명(eCRF 명)	우울증 및 자살 시도 과거력(Past History of Depression, suicidal attempt)
--------------	---

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

우울증 과거력	과거에 우울증 에피소드가 있었습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (PHDYN=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PHDYN=2)
	'예'인 경우 첫 번째 에피소드 발생 시기	YYYY-MM-DD (PHDYN_YDT)
	과거 총 에피소드 횟수(현재 것 제외)	__회 (PHDYN_YCT)
	과거의 에피소드 발현 시 입원을 한 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (PHDHPYN=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PHDHPYN=2)
	'예'인 경우 입원 횟수	__회 (PHDHPYN_YCT)
자살 시도 과거력	과거 자살 시도력이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (PHDSAYN=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (PHDSAYN=2)
	'예'인 경우 시도 횟수(2개월 내 자살시도력 포함)	__회 (PHDSAYN_Y)

도메인명(eCRF 명)	최근(2개월 이내) 자살시도에 관한 병력 (Current suicidal attempt)
--------------	---

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

최근(2개월 이내) 자살시도에 관한 병력	유무	<input type="checkbox"/> 예 (CSYN=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CSYN=2)
	시도방법 중복응답 해당 방법 선택	<input type="checkbox"/> 음독 (CSA1=1)
		<input type="checkbox"/> 농약 (CSA2=1)
		<input type="checkbox"/> 목매 (CSA3=1)
		<input type="checkbox"/> 칼 등 날카로운 물질 (CSA4=1)
		<input type="checkbox"/> 투신/추락 (CSA5=1)
		<input type="checkbox"/> 교통수단 (CSA6=1)
		<input type="checkbox"/> 가스흡입 (CSA7=1)
		<input type="checkbox"/> 익사 (CSA8=1)
	자살시도 장소 중복응답 해당 방법 선택	<input type="checkbox"/> 미상 (CSA9=1)
		<input type="checkbox"/> 기타 (CSA1=10)
		<input type="checkbox"/> 주택 (CSP=1)
		<input type="checkbox"/> 집단거주시설 (CSP=2)
		<input type="checkbox"/> 학교 기타 시설 및 공공행정 구역 (CSP=3)
<input type="checkbox"/> 운동 및 경기장 (CSP=4)		
<input type="checkbox"/> 도로 및 고속도로 (CSP=5)		
자살시도 당시 음주 여부	<input type="checkbox"/> 상업 및 서비스 구역 (CSP=6)	
	<input type="checkbox"/> 산업 및 건설 지역 (CSP=7)	
	<input type="checkbox"/> 농장 (CSP=8)	
	<input type="checkbox"/> 기타 명시된 장소 (CSP=9)	
	<input type="checkbox"/> 상세불명 장소 (CSP=10)	
	<input type="checkbox"/> 음주 (CSAYN=1)	
	<input type="checkbox"/> 비음주 (CSAYN=2)	
자살동기	자살동기 (복수응답가능)	<input type="checkbox"/> 가정문제 (CSMT1=1)
		<input type="checkbox"/> 경제생활 문제 (CSMT2=1)
		<input type="checkbox"/> 육체적 질병 문제 (CSMT3=1)
		<input type="checkbox"/> 정신적, 정신과적 문제 (CSMT4=1)
		<input type="checkbox"/> 직장 또는 업무상의 문제 (CSMT5=1)
		<input type="checkbox"/> 남녀문제 (CSMT6=1)
		<input type="checkbox"/> 사별문제 (CSMT7=1)
		<input type="checkbox"/> 학대 또는 폭력 문제 (CSMT8=1)
		<input type="checkbox"/> 기타 (CSMT9=1)
	<input type="checkbox"/> 미상 (CSMT10=1)	
자살동기 평가자 판단	(CSMTA)	

도메인명(eCRF 명)	방문1_Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)
--------------	---

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

자살생각	1. [죽고 싶은 소망] 죽고 싶다거나 잠든 뒤 깨어나지 않았으면 좋겠다고 바란 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CS1=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS1_Y)
	2. [비특이성 적극적 자살 생각] 실제로 자살을 생각해본 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS2=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CS2=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS2_Y)
	3. [실행 의도가 없이 어떤 방법(계획이 아닌)들을 생각하는 적극적 자살 생각] 어떻게 실행에 옮길 지 생각해본 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS3=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CS3=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS3_Y)
	4. [구체적인 계획 없이, 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각] 이런 생각을 해 본 적이 있으며 실행할 의도가 어느 정도 있었습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS4=1)
	<input type="checkbox"/> 아니오 (CS4=2)	
'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS4_Y)	
5. [구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각] 자살 방법에 대해 자세하게 궁리하기 시작했거나 궁리한 적이 있습니까? 이 계획을 실행에 옮길 의도가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS5=1)	
	<input type="checkbox"/> 아니오 (CS5=2)	
'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS5_Y)	
자살 생각의 심각성	자살 생각의 유형	(CSS0) <input type="checkbox"/> 죽고 싶은 소망 (CSS0=1) <input type="checkbox"/> 비특이성 적극적 자살 생각 (CSS0=2) <input type="checkbox"/> 실행 의도가 없이 어떤 방법들을 생각하는 적극적 자살 생각 (CSS0=3) <input type="checkbox"/> 구체적인 계획 없이 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각 (CSS0=4) <input type="checkbox"/> 구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각 (CSS0=5)
	자살 생각의 설명	(CSS0_ETC)
	[빈도] 평소에 이런 생각을 몇 번이나 하셨습니까?	<input type="checkbox"/> 일주일에 한 번 미만 (CSS1=1)
		<input type="checkbox"/> 일주일에 한 번 (CSS1=2)
		<input type="checkbox"/> 일주일에 2~5번 (CSS1=3)
	<input type="checkbox"/> 매일 또는 거의 매일 (CSS1=4)	
	<input type="checkbox"/> 매일 여러 번 (CSS1=5)	

자살 생각의 심각성	[지속 시간] 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니까?	<input type="checkbox"/> 순간적 - 몇 초 또는 몇 분 (CSS2=1)
		<input type="checkbox"/> 1시간 미만 / 잠시 동안 (CSS2=2)
		<input type="checkbox"/> 1~4시간 / 한참 동안 (CSS2=3)
		<input type="checkbox"/> 4~8시간 / 하루 중 대부분 (CSS2=4)
		<input type="checkbox"/> 8시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적 (CSS2=5)
	[통제 가능성] 자신이 원할 경우 자살하거나 죽고 싶다는 생각을 중단할 수 있었습니까/있습니까?	<input type="checkbox"/> 생각을 통제하려고 노력하지 않는다 (CSS3=0)
		<input type="checkbox"/> 생각을 통제하기가 쉽다 (CSS3=1)
		<input type="checkbox"/> 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다 (CSS3=2)
		<input type="checkbox"/> 생각을 통제하기가 약간 힘들다 (CSS3=3)
		<input type="checkbox"/> 생각을 통제하기가 많이 힘들다 (CSS3=4)
	[저지 요인] 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가 (예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당 없다. 죽고 싶을 뿐이다 (CSS4=0)
		<input type="checkbox"/> 자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다 (CSS4=1)
		<input type="checkbox"/> 저지 요인이 있는 것 같다 (CSS4=2)
		<input type="checkbox"/> 저지 요인이 있는지 확실치 않다 (CSS4=3)
		<input type="checkbox"/> 저지 요인이 없는 것 같다 (CSS4=4)
	[자살 생각의 이유] 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나 어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까?	<input type="checkbox"/> 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. (CSS5=1)
<input type="checkbox"/> 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다 (CSS5=2)		
<input type="checkbox"/> 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다. (CSS5=3)		
<input type="checkbox"/> 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (CSS5=4)		
<input type="checkbox"/> 저지 요인이 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (CSS5=5)		

자살행동	[실제적 기도] 자살을 기도한 적이 있습니까? 자해를 하기 위해 무슨 일을 한 적이 있습니까? 무엇을 했습니까? 목숨을 끊기 위한 방법으로 ____을(를) 했습니까? ____했을 때 (조금이라도) 죽기를 원했습니까? ____했을 때 목숨을 끊으려고 했습니까? 혹은____으로 죽을 가능성이 있다는 생각을 했습니까? 혹은 순전히 다른 이유로 / 자살할 의도가 전혀 없이 (예를 들면, 스트레스를 풀기 위해, 기분 전환을 위해, 동정심을 얻으려고, 또는 상황을 바꾸기 위해서) 그런 일을 했습니까? (자살 의도가 없는 자해 행동)	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR1=1)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CSSR1_Y)
	총 기도 수	__회 (CSSR1_Y_CNT)
	피험자는 비자살적 자해 행동을 했습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR2=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR2=2)
	[방해된 기도] 목숨을 끊기 위해 무엇인가를 시작했지만 실제로 실행하기 전에 누군가에 의해 또는 무슨 일로 중단된 때가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR3=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR3=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CSSR3_Y)
	총 방해된 기도 수	__회 (CSSR3_Y_CNT)
	[중단된 기도] 목숨을 끊으려고 무슨 일을 시작했지만 실제로 행하기 전에 스스로 중단한 때가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR4=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR4=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CSSR4_Y)
	총 중단된 기도 수	__회 (CSSR4_Y_CNT)
	[준비 행위나 행동] 자살을 기도하거나 자살을 준비하기 위한 행동(즉, 약물 수집, 총기 구입, 소중한 물건 나눠주기, 자살 메모 적기)을 취한 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR5=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR5=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CSSR5_Y)
	[자살 행동] 평가 기간 동안 자살 행동이 있었다	<input type="checkbox"/> 예 (CSSRS6=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CSSRS6=1)
실제적 치명성	가장 최근에 발생한 기도 날짜	YYYY-MM-DD (CSSRSDT1)
	가장 치명적인 기도 날짜	YYYY-MM-DD (CSSRSDT2)
	최초의 기도 날짜	YYYY-MM-DD (CSSRSDT3)
	가장 최근에 발생한 기도날짜_코드입력1	<input type="checkbox"/> 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(예: 찰과상) (CSSRSCD1=0) <input type="checkbox"/> 경미한 신체적 손상(예: 어눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (CSSRSCD1=1)

실제적 치명성	가장 최근에 발생한 기도날짜_코드입력1	<input type="checkbox"/> 보통의 신체적 손상; 의학적인 주의 필요(예: 의식은 있으나 혼미한 상태 - 어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈관의 출혈) (CSSRSCD1=2)
		<input type="checkbox"/> 어느 정도 심각한 신체적 손상; 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체20% 미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절) (CSSRSCD1=3)
		<input type="checkbox"/> 심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (CSSRSCD1=4)
	가장 치명적인 기도날짜_코드입력2	<input type="checkbox"/> 사망 (CSSRSCD1=5)
		<input type="checkbox"/> 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(예: 찰과상) (CSSRSCD2=0)
		<input type="checkbox"/> 경미한 신체적 손상(예: 어눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (CSSRSCD2=1)
		<input type="checkbox"/> 보통의 신체적 손상; 의학적인 주의 필요(예: 의식은 있으나 혼미한 상태 - 어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈관의 출혈) (CSSRSCD2=2)
		<input type="checkbox"/> 어느 정도 심각한 신체적 손상; 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체20% 미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절) (CSSRSCD2=3)
	최초의 기도 날짜_코드입력3	<input type="checkbox"/> 심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (CSSRSCD2=4)
		<input type="checkbox"/> 사망 (CSSRSCD2=5)
		<input type="checkbox"/> 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(예: 찰과상) (CSSRSCD3=0)
		<input type="checkbox"/> 경미한 신체적 손상(예: 어눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (CSSRSCD3=1)
	<input type="checkbox"/> 보통의 신체적 손상; 의학적인 주의 필요(예: 의식은 있으나 혼미한 상태 - 어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈관의 출혈) (CSSRSCD3=2)	
	<input type="checkbox"/> 심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (CSSRSCD3=3)	

실제적 치명성	최초의 기도 날짜_코드입력3	<input type="checkbox"/> 심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (CSSRSCD3=4)
		<input type="checkbox"/> 사망 (CSSRSCD3=5)
잠재적 치명성	가장 최근에 발행한 기도 날짜_코드입력4	<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD4=0)
		<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD4=1)
		<input type="checkbox"/> 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높은 행동 (CSSRSCD4=2)
	가장 치명적인 기도 날짜_코드입력5	<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD5=0)
		<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD5=1)
	최초의 기도 날짜_코드입력6	<input type="checkbox"/> 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높은 행동 (CSSRSCD5=2)
<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD6=0)		
<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD6=1)		
		<input type="checkbox"/> 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높은 행동 (CSSRSCD6=2)

도메인명(eCRF 명)	공통_Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)
--------------	--

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

자살생각	1. [죽고 싶은 소망] 죽고 싶다거나 잠든 뒤 깨어나지 않았으면 좋겠다고 바란 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS1_1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CS1_1=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS1_Y_1)
	2. [비특이성 적극적 자살 생각] 실제로 자살을 생각해본 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS2_1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CS2_1=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS2_Y_1)
	3. [실행 의도가 없이 어떤 방법(계획이 아닌)들을 생각하는 적극적 자살 생각] 어떻게 실행에 옮길 지 생각해본 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS3_1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CS3_1=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS3_Y_1)
	4. [구체적인 계획 없이, 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각] 이런 생각을 해 본 적이 있으며 실행할 의도가 어느 정도 있었습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS4_1=1)
	<input type="checkbox"/> 아니오 (CS4_1=2)	
'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS4_Y_1)	
5. [구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각] 자살 방법에 대해 자세하게 궁리하기 시작했거나 궁리한 적이 있습니까? 이 계획을 실행에 옮길 의도가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CS5_1=1)	
	<input type="checkbox"/> 아니오 (CS5_1=2)	
'예'인 경우, 설명하십시오.	(CS5_Y_1)	
자살 생각의 심각성	자살 생각의 유형	(CSS0_1) <input type="checkbox"/> 죽고 싶은 소망 (CSS0_1=1) <input type="checkbox"/> 비특이성 적극적 자살 생각 (CSS0_1=2) <input type="checkbox"/> 실행 의도가 없이 어떤 방법들을 생각하는 적극적 자살 생각 (CSS0_1=3) <input type="checkbox"/> 구체적인 계획 없이 어느 정도 실행 의도가 있는 적극적 자살 생각 (CSS0_1=4) <input type="checkbox"/> 구체적인 계획과 의도가 있는 적극적 자살 생각 (CSS0_1=5)
	자살 생각의 설명	(CSS0_ETC_1)
	[빈도] 평소에 이런 생각을 몇 번이나 하셨습니까?	<input type="checkbox"/> 일주일에 한 번 미만 (CSS1_1=1)
		<input type="checkbox"/> 일주일에 한 번 (CSS1_1=2)
		<input type="checkbox"/> 일주일에 2~5번 (CSS1_1=3)
	<input type="checkbox"/> 매일 또는 거의 매일 (CSS1_1=4)	
	<input type="checkbox"/> 매일 여러 번 (CSS1_1=5)	

자살 생각의 심각성	[지속 시간] 이런 생각을 하면 얼마나 오래 지속됩니까?	<input type="checkbox"/> 순간적 - 몇 초 또는 몇 분 (CSS2_1=1)
		<input type="checkbox"/> 1시간 미만 / 잠시 동안 (CSS2_1=2)
		<input type="checkbox"/> 1~4시간 / 한참 동안 (CSS2_1=3)
		<input type="checkbox"/> 4~8시간 / 하루 중 대부분 (CSS2_1=4)
		<input type="checkbox"/> 8시간 이상 / 끊임없이 또는 지속적 (CSS2_1=5)
	[통제 가능성] 자신이 원할 경우 자살하거나 죽고 싶다는 생각을 중단할 수 있었습니까/있습니까?	<input type="checkbox"/> 생각을 통제하려고 노력하지 않는다 (CSS3_1=0)
		<input type="checkbox"/> 생각을 통제하기가 쉽다 (CSS3_1=1)
		<input type="checkbox"/> 생각을 통제하기가 거의 힘들지 않다 (CSS3_1=2)
		<input type="checkbox"/> 생각을 통제하기가 약간 힘들다 (CSS3_1=3)
		<input type="checkbox"/> 생각을 통제하기가 많이 힘들다 (CSS3_1=4)
	[저지 요인] 죽고 싶은 마음이나 자살에 대한 생각을 실행에 옮기는 것을 막은 사람이나 무언가 (예: 가족, 종교, 죽음의 고통)가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당 없다. 죽고 싶을 뿐이다 (CSS4_1=0)
		<input type="checkbox"/> 자살 기도를 막은 저지 요인이 확실히 있다 (CSS4_1=1)
		<input type="checkbox"/> 저지 요인이 있는 것 같다 (CSS4_1=2)
		<input type="checkbox"/> 저지 요인이 있는지 확실치 않다 (CSS4_1=3)
		<input type="checkbox"/> 저지 요인이 없는 것 같다 (CSS4_1=4)
	[자살 생각의 이유] 죽고 싶거나 자살하고 싶다는 생각을 하게 된 이유는 무엇입니까? 고통을 끝내거나 어떤 감정을 끊으려는 것(다시 말하면 이런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었던 것)이었습니까, 아니면 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었습니까? 아니면 둘 다 해당됩니까?	<input type="checkbox"/> 전적으로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다. (CSS5_1=1)
<input type="checkbox"/> 주로 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것이었다 (CSS5_1=2)		
<input type="checkbox"/> 다른 사람으로부터 관심이나 복수 또는 반응을 얻어내려는 것과 고통을 끝내려는 것이 절반씩이었다. (CSS5_1=3)		
<input type="checkbox"/> 대체적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (CSS5_1=4)		
<input type="checkbox"/> 저지 요인이 전적으로 고통을 끝내려는 것이었다(그런 고통이나 감정으로는 계속 살아갈 수 없었다). (CSS5_1=5)		

자살행동	[실제적 기도] 자살을 기도한 적이 있습니까? 자해를 하기 위해 무슨 일을 한 적이 있습니까? 무엇을 했습니까? 목숨을 끊기 위한 방법으로 ____을(를) 했습니까? ____했을 때 (조금이라도) 죽기를 원했습니까? ____했을 때 목숨을 끊으려고 했습니까? 혹은 ____으로 죽을 가능성이 있다는 생각을 했습니까? 혹은 순전히 다른 이유로 / 자살할 의도가 전혀 없이 (예를 들면, 스트레스를 풀기 위해, 기분 전환을 위해, 동정심을 얻으려고, 또는 상황을 바꾸기 위해서) 그런 일을 했습니까? (자살 의도가 없는 자해 행동)	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR1_1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR1_1=1)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CSSR1_Y_1)
	총 기도 수	__회 (CSSR1_Y_CNT_1)
	피험자는 비자살적 자해 행동을 했습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR2_1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR2_1=2)
	[방해된 기도] 목숨을 끊기 위해 무엇인가를 시작했지만 실제로 실행하기 전에 누군가에 의해 또는 무슨 일로 중단된 때가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR3_1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR3_1=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CSSR3_Y_1)
	총 방해된 기도 수	__회 (CSSR3_Y_CNT_1)
	[중단된 기도] 목숨을 끊으려고 무슨 일을 시작했지만 실제로 행하기 전에 스스로 중단한 때가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR4_1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR4_1=2)
	'예'인 경우, 설명하십시오.	(CSSR4_Y_1)
	총 중단된 기도 수	__회 (CSSR4_Y_CNT_1)
	[준비 행위나 행동] 자살을 기도하거나 자살을 준비하기 위한 행동(즉, 약물 수집, 총기 구입, 소중한 물건 나눠주기, 자살 메모 적기)을 취한 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CSSR5_1=1)
		<input type="checkbox"/> 아니오 (CSSR5_1=2)
'예'인 경우, 설명하십시오.	(CSSR5_Y_1)	
[자살 행동] 평가 기간 동안 자살 행동이 있었다	<input type="checkbox"/> 예 (CSSRS6_1=1)	
	<input type="checkbox"/> 아니오 (CSSRS6_1=2)	
완료된 자살	<input type="checkbox"/> 예 (CSSRS7_1=1)	
	<input type="checkbox"/> 아니오 (CSSRS7_1=2)	

실제적 치명성	가장 최근에 발생한 기도 날짜	YYYY-MM-DD (CSSRSDT1_1)
	가장 치명적인 기도 날짜	YYYY-MM-DD (CSSRSDT2_1)
	최초의 기도 날짜	YYYY-MM-DD (CSSRSDT3_1)
	가장 최근에 발생한 기도날짜_코드입력1	<input type="checkbox"/> 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(예: 찰과상) (CSSRSCD1_1=0)
		<input type="checkbox"/> 경미한 신체적 손상(예: 어눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (CSSRSCD1_1=1)
	가장 최근에 발생한 기도날짜_코드입력1	<input type="checkbox"/> 보통의 신체적 손상; 의학적인 주의 필요(예: 의식은 있으나 혼미한 상태 - 어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈관의 출혈) (CSSRSCD1_1=2)
		<input type="checkbox"/> 어느 정도 심각한 신체적 손상; 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체20% 미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절) (CSSRSCD1_1=3)
		<input type="checkbox"/> 심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (CSSRSCD1_1=4)
		<input type="checkbox"/> 사망 (CSSRSCD1_1=5)
		<input type="checkbox"/> 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(예: 찰과상) (CSSRSCD2=0)
	가장 치명적인 기도날짜_코드입력2	<input type="checkbox"/> 경미한 신체적 손상(예: 어눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (CSSRSCD2_1=1)
		<input type="checkbox"/> 보통의 신체적 손상; 의학적인 주의 필요(예: 의식은 있으나 혼미한 상태 - 어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈관의 출혈) (CSSRSCD2_1=2)
<input type="checkbox"/> 어느 정도 심각한 신체적 손상; 입원 및 경우에 따라서 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상되지 않은 혼수상태, 신체20% 미만의 3도 화상, 출혈이 심하나 회복 가능, 심각한 골절) (CSSRSCD2_1=3)		
<input type="checkbox"/> 심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (CSSRSCD2_1=4)		
<input type="checkbox"/> 사망 (CSSRSCD2_1=5)		
<input type="checkbox"/> 사망 (CSSRSCD2_1=5)		

실제적 치명성	최초의 기도 날짜_코드입력3	<input type="checkbox"/> 신체적 손상이 없거나 매우 경미한 신체적 손상(예: 찰과상) (CSSRSCD3_1=0)
	최초의 기도 날짜_코드입력3	<input type="checkbox"/> 경미한 신체적 손상(예: 어눌한 말투, 1도 화상, 가벼운 출혈, 접질림) (CSSRSCD3_1=1)
잠재적 치명성	가장 최근에 발행한 기도 날짜_코드입력4	<input type="checkbox"/> 보통의 신체적 손상; 의학적인 주의 필요(예: 의식은 있으나 혼미한 상태 - 어느 정도 반응 보임, 2도 화상, 주요 혈관의 출혈) (CSSRSCD3_1=2)
		<input type="checkbox"/> 심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (CSSRSCD3_1=3)
	가장 치명적인 기도 날짜_코드입력5	<input type="checkbox"/> 심각한 신체적 손상; 입원과 함께 집중적인 치료 요구(예: 반사 능력이 손상된 혼수상태, 신체20% 이상의 3도 화상, 생명 징후가 불안정한 과다 출혈, 필수 부위의 심각한 손상) (CSSRSCD3_1=4)
		<input type="checkbox"/> 사망 (CSSRSCD3_1=5)
	최초의 기도 날짜_코드입력6	<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD4_1=0)
		<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD4_1=1)
<input type="checkbox"/> 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높은 행동 (CSSRSCD4_1=2)		
가장 치명적인 기도 날짜_코드입력5	<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD5_1=0)	
	<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD5_1=1)	
	<input type="checkbox"/> 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높은 행동 (CSSRSCD5_1=2)	
최초의 기도 날짜_코드입력6	<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD6_1=0)	
	<input type="checkbox"/> 상해를 초래할 가능성은 높으나 사망으로 이어질 가능성이 거의 없는 행동 (CSSRSCD6_1=1)	
	<input type="checkbox"/> 의학적 치료에도 불구하고 사망으로 이어질 가능성이 높은 행동 (CSSRSCD6_1=2)	

도메인명(eCRF 명)	Beck's Suicide Intent Scale (SIS)
--------------	-----------------------------------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

자살시도를 하지 않은 대상자(연구 등록 1개월 내에 자살의도를 가진 자살사고 병력이 있는 대상자)는 'ND'를 선택하여 주십시오.		Not Determined(ND) (SISND=1)
Part 1 (circumstances)	1. 고립	<input type="checkbox"/> 누군가 있음 (SISP1_1=0) <input type="checkbox"/> 누군가 가까이 있거나 연락이 가능함 (전화통화) (SISP1_1=1) <input type="checkbox"/> 가까이 있거나 연락 가능한 사람이 없음 (SISP1_1=2)
	2. 시간	<input type="checkbox"/> 개입이 가능한 때 시도 (SISP1_2=0) <input type="checkbox"/> 개입이 어려운 때 시도 (SISP1_2=1) <input type="checkbox"/> 개입이 거의 불가능할 때 시도 (SISP1_2=2)
	3. 발견/개입에 대한 경계	<input type="checkbox"/> 경계하지 않음 (SISP1_3=0) <input type="checkbox"/> 수동적인 경계, 다른 사람을 피했지만 개입하지 못하도록 방해하지는 않음 (잠겨있지 않은 방에 혼자 있기) (SISP1_3=1) <input type="checkbox"/> 적극적인 경계(문을 잠금) (SISP1_3=2)
	4. 시도하는 동안 또는 시도 후 도움을 요청하는 행동(적용불가)	<input type="checkbox"/> 도움을 줄 수 있는 사람에게 자살시도에 대해 미리 알렸음 (SISP1_4=0) <input type="checkbox"/> 도움을 줄 수 있는 사람과 접촉을 하였으나 자살시도에 대해 특별히 언급하지 않았음 (SISP1_4=1) <input type="checkbox"/> 도움을 줄 수 있는 사람과 접촉하거나 도움을 요청하지 않음 (SISP1_4=2)
	5. 죽음 준비행동	<input type="checkbox"/> 없음 (SISP1_5=0) <input type="checkbox"/> 죽음을 기대하며 주변정리를 생각하거나 생각했음 (SISP1_5=1) <input type="checkbox"/> 세워진 명확한 계획이 있었음(예, 선물을 나눠줌. 보험가입) (SISP1_5=2)

Part 1 (circumstances)	6. 자살시도 계획정도	<input type="checkbox"/> 준비하지 않음 (SISP1_6=0) <input type="checkbox"/> 약간의 준비 (SISP1_6=1) <input type="checkbox"/> 광범위한 준비 (SISP1_6=2)
	7. 유서	<input type="checkbox"/> 없음 (SISP1_7=0) <input type="checkbox"/> 썼으나 찢어버림, 혹은 생각을 적어 놓음 (SISP1_7=1) <input type="checkbox"/> 유서가 있음 (SISP1_7=2)
	8. 자살시도 전에 자살의도에 대한 표현	<input type="checkbox"/> 없음 (SISP1_8=0) <input type="checkbox"/> 모호한 표현을 했음 (SISP1_8=1) <input type="checkbox"/> 명확한 표현을 했음 (SISP1_8=2)
	Part 1(circumstances) subtotal	(SISP1SUB)
Part 2 (self-report)	1. 자살시도의 목적	<input type="checkbox"/> 주로 주변을 바꾸거나 조종하려 함 (SISP2_1=0) <input type="checkbox"/> "0"과 "2"의 요소를 모두 갖고 있음 (SISP2_1=1) <input type="checkbox"/> 주로 자신을 주변으로부터 제거하려 함 (SISP2_1=2)
	2. 치명적인 행동과 관련된 기대	<input type="checkbox"/> 죽지 않을 것이라 생각했거나, 죽음에 대해 생각하지 않았음 (SISP2_2=0) <input type="checkbox"/> 죽을 수도 있지만 그렇게 되지는 않을 것이라 생각했음 (SISP2_2=1) <input type="checkbox"/> 죽을 것이 틀림없거나 확실하다고 생각했음 (SISP2_2=2)
	3. 방법의 치명성에 대한 생각	<input type="checkbox"/> 생각했던 것보다 상해정도가 심하지 않았거나 치명성에 대해 생각하지 않았음 (SISP2_3=0) <input type="checkbox"/> 자신의 행동이 치명적일 것이라고 확신하지 않았거나 치명적일 수도 있다고 생각했음 (SISP2_3=1) <input type="checkbox"/> 환자가 생각했던 것 이상, 또는 동일한 정도로 치명적임 (SISP2_3=2)
	4. 자살시도의 심각성	<input type="checkbox"/> 자신의 행동을 인생을 끝내기 위한 심각한 시도로 생각하지 않음 (SISP2_4=0) <input type="checkbox"/> 자신의 행동이 인생을 끝내기 위한 심각한 시도인지 확신이 없음 (SISP2_4=1) <input type="checkbox"/> 자신의 행동을 인생을 끝내기 위한 심각한 시도라고 생각함 (SISP2_4=2)
	5. 삶에 대한 양가적 생각	<input type="checkbox"/> 죽고 싶어 하지 않음 (SISP2_5=0) <input type="checkbox"/> 살든지 죽든지 관심 없음 (SISP2_5=1) <input type="checkbox"/> 죽기를 원함 (SISP2_5=2)

Part 2 (self-report)	6. 회복에 대한 생각	<input type="checkbox"/> 의학적 치료를 받는다면 죽지 않을 것이라 생각함 (SISP2_6=0) <input type="checkbox"/> 의학적 치료를 통해 죽음을 피할 수 있을지 확신하지 못함 (SISP2_6=1) <input type="checkbox"/> 의학적 치료를 받더라도 죽을 것이라 확신함 (SISP2_6=2)
	7. 사전고려의 정도	<input type="checkbox"/> 충동적 (SISP2_7=0) <input type="checkbox"/> 자살시도 하기 전 3시간 혹은 그 보다 짧은 시간 숙고하였음 (SISP2_7=1) <input type="checkbox"/> 자살시도 하기 전 3시간 이상 숙고하였음 (SISP2_7=2)
	Part 2(self-report) subtotal	(SISP2SUB)
Total	(SISTO)	

도메인명(eCRF 명)	21-Items Hamilton Depression Rating Scale (21-items HAM-D)
--------------	--

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

1. Depression mood (sadness, hopeless, worthless)	<input type="checkbox"/> 없다. (21IHD1=0) <input type="checkbox"/> 물어보았을 때만 우울한 기분이라고 말한다. (21IHD1=1) <input type="checkbox"/> 자발적으로 우울한 기분이라고 말한다. (21IHD1=2) <input type="checkbox"/> 얼굴 표정, 자세, 목소리, 쉽게 우는 경향과 같은 비언어적인 표현을 통해 우울한 기분을 나타낸다. (21IHD1=3) <input type="checkbox"/> 오로지 우울한 기분만을, 언어적·비언어적 표현을 통해 나타낸다. (21IHD1=4)
2. Feeling of guilty	<input type="checkbox"/> 없다. (21IHD2=0) <input type="checkbox"/> 자책하거나 자신이 사람들을 실망시킨다고 느낀다. (21IHD2=1) <input type="checkbox"/> 죄를 지었다고 생각한다면 과거의 실수나 자신이 한 나쁜 행위에 대해 반복적으로 생각한다. (21IHD2=2) <input type="checkbox"/> 현재의 병을 별로 여긴다. 죄책망상이 있다. (21IHD2=3) <input type="checkbox"/> 비난 또는 탄핵하는 목소리를 듣거나 위협적인 환시를 경험한다. (21IHD2=4)
3. Suicide	<input type="checkbox"/> 없다. (21IHD3=0) <input type="checkbox"/> 인생이 살 가치가 없다고 느낀다. (21IHD3=1) <input type="checkbox"/> 차라리 죽었으면 하거나 죽는 것에 대한 상상을 한다. (21IHD3=2) <input type="checkbox"/> 자살 사고가 있거나 자살기도처럼 볼 수 있는 행동을 한다. (21IHD3=3) <input type="checkbox"/> 심각한 자살 기도를 한다. (21IHD3=4)
4. Insomnia early	<input type="checkbox"/> 잠드는 데 어려움이 없다. (21IHD4=0) <input type="checkbox"/> 간간이 잠들기가 어렵다(잠드는 데 30분 이상 걸린다). (21IHD4=1) <input type="checkbox"/> 매일 밤 잠들기가 어렵다. (21IHD4=2)
5. Insomnia middle	<input type="checkbox"/> 어려움이 없다. (21IHD5=0) <input type="checkbox"/> 편하고 깊게 자지 못한다. (21IHD5=1) <input type="checkbox"/> 한밤중에 깨어 뒤척이거나 잠자리에서 벗어나는 경우 2점으로 평가한다(소변을 보기 위한 경우는 제외한다). (21IHD5=2)
6. Insomnia late	<input type="checkbox"/> 어려움이 없다. (21IHD6=0) <input type="checkbox"/> 새벽에 깨지만 다시 잠이 든다. (21IHD6=1) <input type="checkbox"/> 일단 깨어나면 다시 잠들 수 없다. (21IHD6=2)
7. Work and activities	<input type="checkbox"/> 어려움이 없다. (21IHD7=0) <input type="checkbox"/> 제대로 할 수 없다고 느낀다. 일이나 취미와 같은 활동에 대해 피로하거나 기력이 떨어졌다고 느낀다. (21IHD7=1) <input type="checkbox"/> 일이나 취미와 같은 활동에 흥미를 잃는다 - 환자가 직접 이야기하거나 무관심, 우유부단, 망설임을 통해 간접적으로 나타낸다(일이나 활동을 억지로 한다고 느낀다). (21IHD7=2) <input type="checkbox"/> 활동 시간이 줄거나 생산성이 떨어져 있다. 입원 환자의 경우, 병동생활에서의 개인적인 자질구레한 일을 제외한 활동(원내 작업이나 취미)에 보내는 시간이 하루 3시간을 넘지 못한다. (21IHD7=3) <input type="checkbox"/> 현재의 병 때문에 일을 중단한다. 입원 환자의 경우, 병동생활에서의 개인적인 자질구레한 일 이외에는 전혀 활동을 하지 않거나 도움 없이는 병동생활에서

	의 개인적인 자질구레한 일도 해내지 못한다. (21IHD7=4)	
8. Retardation	<input type="checkbox"/> 정상적으로 말하고 생각한다. (21IHD8=0) <input type="checkbox"/> 면담할 때 약간 지체되어 있다. (21IHD8=1) <input type="checkbox"/> 면담할 때 뚜렷이 지체되어 있다. (21IHD8=2) <input type="checkbox"/> 면담이 어려울 정도로 지체되어 있다. (21IHD8=3) <input type="checkbox"/> 완전한 혼미 상태에 있다. (21IHD8=4)	
9. Agitation	<input type="checkbox"/> 없다. (21IHD9=0) <input type="checkbox"/> 조금 초조한 듯하다. (21IHD9=1) <input type="checkbox"/> 손이나 머리카락 등을 만지작거린다. (21IHD9=2) <input type="checkbox"/> 가만히 앉아 있지 못하고 몸을 자꾸 움직인다. (21IHD9=3) <input type="checkbox"/> 손을 비비꼬거나 손톱을 물어뜯거나 머리카락을 잡아당기거나 입술을 깨문다. (21IHD10=4)	
10. Anxiety psychic	<input type="checkbox"/> 없다. (21IHD10=0) <input type="checkbox"/> 긴장감과 과민함을 느낀다. (21IHD10=1) <input type="checkbox"/> 사소한 일들에 대해 걱정을 한다. (21IHD10=2) <input type="checkbox"/> 얼굴 표정이나 말에서 염려하는 태도가 뚜렷하다. (21IHD10=3) <input type="checkbox"/> 묻지 않아도 심한 공포가 드러난다. (21IHD10=4)	
11. Anxiety somatic	<input type="checkbox"/> 없다 (21IHD11=0) <input type="checkbox"/> 경도 (21IHD11=1) <input type="checkbox"/> 중등도 (21IHD11=2) <input type="checkbox"/> 고도 (21IHD11=3) <input type="checkbox"/> 최고도(기능을 전혀 할 수 없을 정도이다). (21IHD11=4)	
12. Somatic symptoms gastrointestinal	<input type="checkbox"/> 없다. (21IHD12=0) <input type="checkbox"/> 입맛을 잃었지만 치료진의 격려 없이도 먹는다. 속이 더부룩하다. (21IHD12=1) <input type="checkbox"/> 치료진의 강요 없이는 잘 먹지 않는다. 하제나 소화제 등 위장관계 증상에 대한 약제를 요구하거나 필요로 한다. (21IHD12=2)	
13. Somatic symptoms general	<input type="checkbox"/> 없다. (21IHD13=0) <input type="checkbox"/> 팔, 다리, 등, 머리가 무겁다. 등의 통증, 두통, 근육통. 기운이 없고 쉽게 피곤해진다. (21IHD13=1) <input type="checkbox"/> 매우 뚜렷한 신체증상이 있다. (21IHD13=2)	
14. Genital symptoms	<input type="checkbox"/> 없다 (21IHD14=0) <input type="checkbox"/> 경도 (21IHD14=1) <input type="checkbox"/> 고도 (21IHD14=2)	
15. Hypochondriasis	<input type="checkbox"/> 없다. (21IHD15=0) <input type="checkbox"/> 몸에 대해 많이 생각한다. (21IHD15=1) <input type="checkbox"/> 건강에 대해 집착한다. (21IHD15=2) <input type="checkbox"/> 건강이 나쁘다고 자주 호소하거나 도움을 청한다. (21IHD15=3) <input type="checkbox"/> 건강염려증적 망상이 있다. (21IHD15=4)	
16. Loss of weight	A 또는 B로 평가한다.	A. 병력에 의해 평가할 때 <input type="checkbox"/> 체중감소가 없다. (21IHD16=0) <input type="checkbox"/> 현재의 병으로 인해 체중감소가 있는 것 같다. (21IHD16=1)

		<input type="checkbox"/> (환자에 따르면) 확실한 체중감소가 있다. (21IHD16=2) B. 매주 체중 변화를 측정했을 때 <input type="checkbox"/> 주당 0.5kg 미만의 체중감소. (21IHD16=0) <input type="checkbox"/> 주당 0.5kg 이상, 1kg 미만의 체중감소. (21IHD16=1) <input type="checkbox"/> 주당 1kg 이상의 체중감소. (21IHD16=2)
17. Insight	<input type="checkbox"/> 자신이 우울하고 병들었다는 것을 인식한다. (21IHD17=0) <input type="checkbox"/> 병들었다는 것을 인정하지만 음식, 날씨, 과로, 바이러스, 휴식 부족 등이 이유라고 생각한다. (21IHD17=1) <input type="checkbox"/> 자신의 병을 전적으로 부인한다. (21IHD17=2)	
18. Diurnal variation	A 또는 B로 평가한다.	A. 증상이 오전이나 혹은 오후에 나빠지는가를 확인해서 표시 <input type="checkbox"/> 변동 없음 (21IHD18=0) <input type="checkbox"/> 오전에 나빠짐 (21IHD18=1) <input type="checkbox"/> 오후에 나빠짐 (21IHD18=2) B. 일중 변화가 있을 때, 변화의 심한 정도를 표시하고, 만약 없다면 없음으로 표시 <input type="checkbox"/> 없음 (21IHD18=0) <input type="checkbox"/> 경도 (21IHD18=1) <input type="checkbox"/> 심한 정도 (21IHD18=2)
19. Depersonalization and derealization		<input type="checkbox"/> 없음 (21IHD19=0) <input type="checkbox"/> 경도 (21IHD19=1) <input type="checkbox"/> 중등도 (21IHD19=2) <input type="checkbox"/> 중증 (21IHD19=3) <input type="checkbox"/> 거의 무능력 상태 (21IHD19=4)
20. Paranoid symptom		<input type="checkbox"/> 없음 (21IHD20=0) <input type="checkbox"/> 의심증 (21IHD20=1) <input type="checkbox"/> 관계사고 (21IHD20=2) <input type="checkbox"/> 관계망상과 피해망상 (21IHD20=3)
21. Obsession and compulsion		<input type="checkbox"/> 없음 (21IHD21=0) <input type="checkbox"/> 경도 (21IHD21=1) <input type="checkbox"/> 심한 정도 (21IHD21=2)
총점	(21IHDT0)	

도메인명(eCRF 명)	Beck's Scale for Suicidal Ideation (BSSI)
--------------	---

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

1. 살고 싶은 소망이 있나요?	<input type="checkbox"/> 보통 혹은 많이 있다. (BSSI1=0) <input type="checkbox"/> 약간 있다. (BSSI1=1) <input type="checkbox"/> 전혀 없다. (BSSI1=2)
2. 죽고 싶은 소망이 있나요?	<input type="checkbox"/> 전혀 없다. (BSSI2=0) <input type="checkbox"/> 약간 있다. (BSSI2=1) <input type="checkbox"/> 보통 혹은 많이 있다. (BSSI2=2)
3. 살고 싶은 이유 / 죽고 싶은 이유는 무엇인가요?	<input type="checkbox"/> 사는 것이 죽는 것 보다 낫기 때문에 (BSSI3=0) <input type="checkbox"/> 사는 것이나 죽는 것이나 마찬가지다. (BSSI3=1) <input type="checkbox"/> 죽는 것이 사는 것보다 낫기 때문에 (BSSI3=2)
4. 실제로 자살시도를 하려는 욕구가 있나요?	<input type="checkbox"/> 전혀 없다. (BSSI4=0) <input type="checkbox"/> 약간 있다. (BSSI4=1) <input type="checkbox"/> 보통 혹은 많이 있다. (BSSI4=2)
5. 별로 적극적이지 않고 수동적인 자살 욕구가 생길 때는 어떻게 할 것인가요?	<input type="checkbox"/> 생명을 건지기 위해 필요한 조치를 미리 할 것이다. (BSSI5=0) <input type="checkbox"/> 삶과 죽음을 운명에 맡기겠다. (BSSI5=1) <input type="checkbox"/> 살기 위한 노력을 하지 않겠다. (BSSI5=2)
6. 자살하고 싶은 생각이나 소망이 얼마나 오랫동안 지속되나요?	<input type="checkbox"/> 잠깐 그런 생각이 들다가 곧 사라진다. (BSSI6=0) <input type="checkbox"/> 한동안 그런 생각이 계속된다. (BSSI6=1) <input type="checkbox"/> 계속, 거의 항상 그런 생각이 지속된다. (BSSI6=2)
7. 얼마나 자주 자살하고 싶은 생각이 드나요?	<input type="checkbox"/> 거의 그런 생각이 들지 않는다. (BSSI7=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그런 생각이 든다. (BSSI7=0) <input type="checkbox"/> 그런 생각이 계속 지속된다. (BSSI7=0)
8. 자살생각이나 소망에 대한 귀하의 태도는 어떤가요?	<input type="checkbox"/> 절대로 받아들이지 않는다. (BSSI8=0) <input type="checkbox"/> 양가적이거나 크게 개의치 않는다. (BSSI8=1) <input type="checkbox"/> 그런 생각을 받아들인다. (BSSI8=2)
9. 자살하고 싶은 충동을 통제할 수 있나요?	<input type="checkbox"/> 충분히 통제할 수 있다. (BSSI9=0) <input type="checkbox"/> 통제 할 수 있을지 확신 할 수 없다. (BSSI9=1) <input type="checkbox"/> 전혀 통제할 수 없을 것 같다. (BSSI9=2)
10. 자살시도에 대한 방해물이 있다면 어떻게 할 것인가요? (예:가족, 종교, 다시 살 수 없다는 생각 등)	<input type="checkbox"/> 방해물 때문에 자살 시도를 하지 않을 것이다. (BSSI10=0) <input type="checkbox"/> 방해물 때문에 조금은 마음이 쓰인다. (BSSI10=1) <input type="checkbox"/> 방해물에 개의치 않는다. (BSSI10=2)
11. 자살에 대해 깊게 생각해 본 이유는 무엇인가요?	<input type="checkbox"/> 자살에 대해 생각해 본 적이 없다. / 주변 사람들을 조종하기 위해서: 관심을 끌거나 보복하기 위해서 (BSSI11=0) <input type="checkbox"/> 주변 사람들의 관심을 끌고 보복하거나, 현실 도피의 방법으로 (BSSI11=1) <input type="checkbox"/> 현실 도피적인 문제해결 방법으로 (BSSI11=2)

<p>12. 자살에 대해 깊게 생각 했을 때 구체적인 방법까지 계획 했나요?</p>	<p><input type="checkbox"/> 자살에 대해 생각해 본 적이 없다. (BSSI12=0) <input type="checkbox"/> 자살 생각을 했으나 구체적인 방법까지는 생각하지 않았다. (BSSI12=1) <input type="checkbox"/> 구체적인 방법을 자세하고 치밀하게 생각해 놓았다. (BSSI12=2)</p>
<p>13. 자살 방법을 깊게 생각 했다면 그것이 얼마나 현실적으로 실현 가능하며, 또한 시도할 기회가 있다고 생각하나요?</p>	<p><input type="checkbox"/> 방법도 현실적으로 실현 가능하지 않고, 기회도 없을 것이다. (BSSI13=0) <input type="checkbox"/> 방법이 시간과 노력이 필요하며, 기회가 쉽게 오지 않을 것이다. (BSSI13=1) <input type="checkbox"/> 생각한 방법이 현실적으로 실현가능하며, 기회도 있을 것이다. / 앞으로 기회나 방법이 생길 것 같다. (BSSI13=2)</p>
<p>14. 실제로 자살할 수 있는 능력이 있다고 생각하나요?</p>	<p><input type="checkbox"/> 용기가 없고 너무 약하고 두렵고 능력이 없어서 자살 할 수 없다. (BSSI14=0) <input type="checkbox"/> 자살할 용기와 능력이 있는 지 확신할 수 없다. (BSSI14=1) <input type="checkbox"/> 자살할 용기와 자신이 있다. (BSSI14=2)</p>
<p>15. 정말로 자살 시도를 할 것이라고 확신하나요?</p>	<p><input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다. (BSSI15=0) <input type="checkbox"/> 잘 모르겠다. (BSSI15=1) <input type="checkbox"/> 그렇다. (BSSI15=2)</p>
<p>16. 자살에 대한 생각을 실행하기 위해 실제로 준비한 것이 있나요?</p>	<p><input type="checkbox"/> 없다. (BSSI16=0) <input type="checkbox"/> 부분적으로 했다 (예: 약을 사모으기 시작함). (BSSI16=1) <input type="checkbox"/> 완전하게 준비했다 (예: 약을 사모았다). (BSSI16=2)</p>
<p>17. 자살하려는 글(유서)을 쓴 적이 있나요?</p>	<p><input type="checkbox"/> 없다. (BSSI17=0) <input type="checkbox"/> 쓰기 시작했으나 다 쓰지 못했다: 단지 쓰려고 생각했다. (BSSI17=1) <input type="checkbox"/> 다 써 놓았다. (BSSI17=2)</p>
<p>18. 죽음을 예상하고 마지막 정리를 한 적 있나요? (예 : 보험, 유언 등)</p>	<p><input type="checkbox"/> 없다. (BSSI18=0) <input type="checkbox"/> 생각만 해 보았거나, 약간의 정리를 했다. (BSSI18=1) <input type="checkbox"/> 확실한 계획을 세웠거나 다 정리를 해 놓았다. (BSSI18=2)</p>
<p>19. 자살에 대한 생각을 다른 사람들에게 이야기한 적이 있습니까, 혹은 속이거나 숨겼습니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 자살에 대해 생각해 본 적이 없다. / 다른 사람에게 터놓고 이야기 하였다. (BSSI19=0) <input type="checkbox"/> 드러내는 것을 주저하다가 숨겼다. (BSSI19=1) <input type="checkbox"/> 그런 생각을 속이고, 숨겼다. (BSSI19=2)</p>
<p>총점</p>	<p>(BSSITO)</p>

도메인명(eCRF 명)	Generalized Anxiety Disorder-7(GAD-7)
--------------	---------------------------------------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

1. 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다	<input type="checkbox"/> 전혀 방해 받지 않았다 (GAD1=0) <input type="checkbox"/> 며칠 동안 방해 받았다 (GAD1=1) <input type="checkbox"/> 7일 이상 방해 받았다 (GAD1=2) <input type="checkbox"/> 거의 매일 방해 받았다 (GAD1=3)
2. 걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다	<input type="checkbox"/> 전혀 방해 받지 않았다 (GAD2=0) <input type="checkbox"/> 며칠 동안 방해 받았다 (GAD2=1) <input type="checkbox"/> 7일 이상 방해 받았다 (GAD2=2) <input type="checkbox"/> 거의 매일 방해 받았다 (GAD2=3)
3. 여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다	<input type="checkbox"/> 전혀 방해 받지 않았다 (GAD3=0) <input type="checkbox"/> 며칠 동안 방해 받았다 (GAD3=1) <input type="checkbox"/> 7일 이상 방해 받았다 (GAD3=2) <input type="checkbox"/> 거의 매일 방해 받았다 (GAD3=3)
4. 편하게 있기가 어렵다	<input type="checkbox"/> 전혀 방해 받지 않았다 (GAD4=0) <input type="checkbox"/> 며칠 동안 방해 받았다 (GAD4=1) <input type="checkbox"/> 7일 이상 방해 받았다 (GAD4=2) <input type="checkbox"/> 거의 매일 방해 받았다 (GAD4=3)
5. 너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다	<input type="checkbox"/> 전혀 방해 받지 않았다 (GAD5=0) <input type="checkbox"/> 며칠 동안 방해 받았다 (GAD5=1) <input type="checkbox"/> 7일 이상 방해 받았다 (GAD5=2) <input type="checkbox"/> 거의 매일 방해 받았다 (GAD5=3)
6. 쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다	<input type="checkbox"/> 전혀 방해 받지 않았다 (GAD6=0) <input type="checkbox"/> 며칠 동안 방해 받았다 (GAD6=1) <input type="checkbox"/> 7일 이상 방해 받았다 (GAD6=2) <input type="checkbox"/> 거의 매일 방해 받았다 (GAD6=3)
7. 마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다	<input type="checkbox"/> 전혀 방해 받지 않았다 (GAD7=0) <input type="checkbox"/> 며칠 동안 방해 받았다 (GAD7=1) <input type="checkbox"/> 7일 이상 방해 받았다 (GAD7=2) <input type="checkbox"/> 거의 매일 방해 받았다 (GAD7=3)
총점	(GADTOT)

도메인명(eCRF 명)	Barratt Impulsiveness Scale (KBIS-11)
--------------	---------------------------------------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

1. 나는 일을 시작하기 전에 세밀하게 계획을 세운다.	<input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS1=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS1=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS1=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS1=4)
2. 나는 깊이 생각하지 않고 일을 한다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS2=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS2=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS2=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS2=4)
3. 나는 결정을 빨리 내리는 편이다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS3=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS3=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS3=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS3=4)
4. 나는 낙천적인 사람이다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS4=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS4=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS4=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS4=4)
5. 나는 집중을 잘 못한다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS5=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS5=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS5=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS5=4)
6. 나는 온갖 생각을 쉬지 않고 떠올린다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS6=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS6=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS6=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS6=4)
7. 나는 여행을 떠나기 전에 세밀하게 계획을 세운다.	<input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS7=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS7=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS7=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS7=4)
8. 나는 자제력이 있는 편이다.	<input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS8=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS8=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS8=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS8=4)
9. 나는 어떤 일에든지 쉽게 집중할 수 있다.	<input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS9=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS9=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS9=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS9=4)
10. 나는 꾸준히 저축을 한다.	<input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS10=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS10=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS10=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS10=4)

<p>11. 나는 일(공부)할 때나 놀 때 잠시도 몸을 가만히 두지 못한다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS11=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS11=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS11=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS11=4)</p>
<p>12. 나는 주의깊게 생각하는 사람이다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS12=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS12=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS12=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS12=4)</p>
<p>13. 나는 안정된 직장(학교) 생활을 유지하려 애쓴다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS13=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS13=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS13=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS13=4)</p>
<p>14. 나는 깊이 생각하지 않고 말을 한다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS14=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS14=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS14=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS14=4)</p>
<p>15. 나는 복잡한 문제를 놓고 생각하는 것을 좋아한다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS15=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS15=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS15=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS15=4)</p>
<p>16. 나는 직장(학교나 학원 등)을 옮겨 다닌다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS16=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS16=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS16=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS16=4)</p>
<p>17. 나는 충동적으로 행동한다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS17=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS17=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS17=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS17=4)</p>
<p>18. 나는 복잡한 문제에 대해 생각하려고 하면 곧 싫증이 난다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS18=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS18=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS18=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS18=4)</p>
<p>19. 나는 즉흥적으로 생각한다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS19=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS19=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS19=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS19=4)</p>
<p>20. 나는 골똘히 생각하는 편이다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS20=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS20=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS20=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS20=4)</p>

21. 나는 자주 이사다니는 편이다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS21=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS21=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS21=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS21=4)
22. 나는 충동구매를 하곤 한다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS22=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS22=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS22=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS22=4)
23. 나는 한번에 하나씩만 생각한다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS23=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS23=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS23=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS23=4)
24. 나는 취미가 자주 바뀐다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS24=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS24=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS24=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS24=4)
25. 나는 버는 것 이상으로 돈을 쓰는 편이다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS25=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS25=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS25=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS25=4)
26. 나는 종종 주제와 관계없는 생각들을 하곤 한다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS26=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS26=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS26=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS26=4)
27. 나는 미래보다는 현재에 더 관심이 있다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS27=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS27=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS27=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS27=4)
28. 나는 영화를 보거나 강의를 들을 때 가만히 앉아 있지 못한다.	<input type="checkbox"/> 1=전혀 그렇지 않다 (KBIS28=1) <input type="checkbox"/> 2=가끔 그렇다 (KBIS28=2) <input type="checkbox"/> 3=자주 그렇다 (KBIS28=3) <input type="checkbox"/> 4=항상 그렇다 (KBIS28=4)
29. 나는 어려운 문제 푸는 것을 좋아한다.	<input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS29=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS29=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS29=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS29=4)
30. 나는 미래 지향적인 사람이다.	<input type="checkbox"/> 1=항상 그렇다 (KBIS30=1) <input type="checkbox"/> 2=자주 그렇다 (KBIS30=2) <input type="checkbox"/> 3=가끔 그렇다 (KBIS30=3) <input type="checkbox"/> 4=전혀 그렇지 않다 (KBIS30=4)
총점	(KBISTOT)

도메인명(eCRF 명)	한국판 UCLA 외로움 척도 (3판)
--------------	----------------------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

1. 얼마나 자주 주변 사람들과 잘 통한다고 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA1=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA1=1) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA1=2) <input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA1=3)
2. 얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA2=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA2=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA2=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA2=3)
3. 얼마나 자주 도움을 청할 사람이 아무도 없다고 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA3=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA3=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA3=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA3=3)
4. 얼마나 자주 혼자라고 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA4=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA4=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA4=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA4=3)
5. 얼마나 자주 친구들과 모임에 속해 있다고 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA5=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA5=1) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA5=2) <input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA5=3)
6. 얼마나 자주 당신 주위사람들과 비슷한 점이 많다고 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA6=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA6=1) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA6=2) <input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA6=3)
7. 얼마나 자주 당신이 더 이상 아무하고도 가깝지 않다고 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA7=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA7=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA7=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA7=3)

<p>8. 얼마나 자주 당신의 흥미와 생각들이 주변사람과 나누어지지 않는다고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA8=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA8=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA8=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA8=3)</p>
<p>9. 얼마나 자주 자신이 적극적이고 호의적이라고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA9=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA9=1) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA9=2) <input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA9=3)</p>
<p>10. 얼마나 자주 사람들과 가깝다고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA10=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA10=1) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA10=2) <input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA10=3)</p>
<p>11. 얼마나 자주 혼자 남겨졌다고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA11=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA11=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA11=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA11=3)</p>
<p>12. 얼마나 자주 다른 사람들과의 관계가 의미 없다고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA12=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA12=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA12=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA12=3)</p>
<p>13. 얼마나 자주 당신을 진정으로 아는 사람이 아무도 없다고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA13=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA13=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA13=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA13=3)</p>
<p>14. 얼마나 자주 다른 사람들로부터 고립되어 있다고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA14=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA14=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA14=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA14=3)</p>

<p>15. 얼마나 자주 당신이 원할 때에 함께 있어줄 사람을 찾을수 있다고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA15=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA15=1) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA15=2) <input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA15=3)</p>
<p>16. 얼마나 자주 당신을 정말 이해해 주는 사람들이 있다고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA16=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA16=1) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA16=2) <input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA16=3)</p>
<p>17. 얼마나 자주 수줍음을 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA17=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA17=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA17=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA17=3)</p>
<p>18. 얼마나 자주 사람들이 당신과 진정으로 함께 있지 않고 그저 주위에 있는 것이라고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA18=0) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA18=1) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA18=2) <input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA18=3)</p>
<p>19. 얼마나 자주 당신이 얘기할 수 있는 사람들이 주변에 있다고 생각합니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA19=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA19=1) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA19=2) <input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA19=3)</p>
<p>20. 얼마나 자주 당신이 도움을 청할 수 있는 사람들이 있다고 느끼십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 항상 그렇다 (UCLA20=0) <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 (UCLA20=1) <input type="checkbox"/> 드물게 그렇다 (UCLA20=2) <input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (UCLA20=3)</p>
<p>총점</p>	<p>(UCLATOT)</p>

도메인명(eCRF 명)	EQ-5D-3L, 오늘의 건강 상태
--------------	---------------------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

운동 능력	<input type="checkbox"/> 나는 걷는데 지장이 없다 (EQ5D1=1) <input type="checkbox"/> 나는 걷는데 다소 지장이 있다 (EQ5D1=2) <input type="checkbox"/> 나는 종일 누워있어야 한다 (EQ5D1=3)
자기 관리	<input type="checkbox"/> 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다 (EQ5D2=1) <input type="checkbox"/> 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다 (EQ5D2=2) <input type="checkbox"/> 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다 (EQ5D2=3)
일상 행동(예 : 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가 활동)	<input type="checkbox"/> 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다 (EQ5D3=1) <input type="checkbox"/> 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다 (EQ5D3=2) <input type="checkbox"/> 나는 일상 활동을 할 수가 없다 (EQ5D3=3)
통증/불편	<input type="checkbox"/> 나는 통증이나 불편감이 없다 (EQ5D4=1) <input type="checkbox"/> 나는 다소 통증이나 불편감이 있다 (EQ5D4=2) <input type="checkbox"/> 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다 (EQ5D4=3)
불안/우울	<input type="checkbox"/> 나는 불안하거나 우울하지 않다 (EQ5D5=1) <input type="checkbox"/> 나는 다소 불안하거나 우울하다 (EQ5D5=2) <input type="checkbox"/> 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다 (EQ5D5=3)
오늘의 건강 상태	(VAS)

도메인명(eCRF 명)	CSRI (Client Service Receipt Inventory)
--------------	---

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

1. 지난 1개월동안 다음 서비스를 이용했습니까?	<input type="checkbox"/> 1=예 (CSRI1=1) <input type="checkbox"/> 2=아니오 (CSRI1=2)	
지난 1개월 동안 다음 서비스를 몇 번 이용했습니까?	서비스 유형	<input type="checkbox"/> 1=응급실 방문 (CSRI1_1=1)
	횟수	(CSRI1_2)
지난 1개월 동안 다음 서비스를 몇 번 이용했습니까?	서비스 유형	<input type="checkbox"/> 1=입원치료 (CSRI1_3=1) <input type="checkbox"/> 2=외래방문 (CSRI1_3=2) <input type="checkbox"/> 3=의사 처방약물 복용 (CSRI1_3=3)
	진료과목	<input type="checkbox"/> 1=정신건강의학과 (CSRI1_4=1) <input type="checkbox"/> 2=그 외 진료과목 (CSRI1_4=2)
	일	(CSRI1_5)
2. 지난 1개월간 건강상태 때문에 며칠동안 휴가(병가)를 냈습니까?	(CSRI2)	
3. 지난 1개월간 정신건강복지센터를 몇 번 방문하셨습니까?	(CSRI3)	
4. 지난 1개월간 다른 지역사회기반 서비스를 이용하셨습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CSRI4=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CSRI4=2)	

<p>지난 1개월간 다른 지역사회기반 서비스를 몇 번이나 이용하셨습니까? (예: 체육관, 요가, 필라테스, 명상, 마사지, 대체요법 (침, 추나, 부항, 사우나), 미술/음악수업, 춤 등)</p>	<p>지역사회 기반서비스의 명칭 (민간운영)</p>	<p>(CSRI4_1)</p>
	<p>횟수</p>	<p>(CSRI4_2)</p>
	<p>비용(1개월)</p>	<p>(CSRI4_3)</p>
<p>5. 지난 1개월간 건강보조식품을 복용하였습니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 예 (CSRI5=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CSRI5=2)</p>	
<p>건강보조식품종류</p>	<p>오메가-3 (피쉬오일)_횟수</p>	<p>(CSRI5_1_CNT)</p>
	<p>오메가-3 (피쉬오일)_비용</p>	<p>(CSRI5_1_CT)</p>
	<p>유산균(프로바이오틱스)/프리바이오틱스_횟수</p>	<p>(CSRI5_2_CNT)</p>
	<p>유산균(프로바이오틱스)/프리바이오틱스_비용</p>	<p>(CSRI5_2_CT)</p>
	<p>비타민/미네랄_횟수</p>	<p>(CSRI5_3_CNT)</p>
	<p>비타민/미네랄_비용</p>	<p>(CSRI5_3_CT)</p>
	<p>약초약물/허브차 (예: 세인트존스워트, 홍삼, 강황, 녹차 등)_횟수</p>	<p>(CSRI5_4_CNT)</p>
<p>기타</p>	<p>기타_건강보조식품 종류</p>	<p>(CSRI5_5_NM)</p>
	<p>기타_횟수 (병당, 팩당 등.)</p>	<p>(CSRI5_5_CNT)</p>
	<p>기타_단위당 비용</p>	<p>(CSRI5_5_CT)</p>
<p>6. 병원을 방문하는데 소요되는 편도시간: 건강 및 사회복지전문가들을 만나기 위해 편도이동에 소요된 평균시간을 말씀해 주십시오</p>	<p>(CSRI6)</p>	

<p>8-1 혼자 거주하십니까?</p>	<p>애완동물 제외</p>	<p><input type="checkbox"/> 예 (CSRI8_1=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CSRI8_1=2)</p>
<p>8-2 만일 당신이 개/고양이와 같은 애완동물을 키우신다면, 1개월동안 애완동물을 위해 얼마를 쓰십니까?</p>	<p>개/고양이와 같은 애완동물 키우지 않을 경우 비용 입력하지 마십시오.</p>	<p>(CSRI8_2)</p>
<p>9. 일상생활에 도움을 준 사람은 누구입니까?(예: 요리, 청소, 쇼핑, 운전, 은행일/비용 지불, 감독/관찰 등) 다음중 하나를 선택해 주세요.</p>	<p><input type="checkbox"/> 보호자(가족, 친구등의 무급간병인) (CSRI9=1) <input type="checkbox"/> 간병인(공공부문에서 급여지급) (CSRI9=2) <input type="checkbox"/> 도우미(개인적으로 급여지급) (CSRI9=3) <input type="checkbox"/> 없음 (CSRI9=4)</p>	
<p>10. 9번 문항에서 1),2),3)에 해당하는 경우에만 응답하십시오.</p>	<p>1) 만일 그렇다면, 일주일에 몇 시간동안 당신을 도와/돌보아 주었나요?</p>	<p>(CSRI10_1)</p>
	<p>2) 지난 1개월동안 당신을 돌보거나 방문하기 위해 보호자가 일을 줄이거나 직장을 쉬었습니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 예 (CSRI10_2=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CSRI10_2=2)</p>

도메인명(eCRF 명)	치료 지속 여부
--------------	----------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

치료 지속 여부(Treatment Adherence)	집중사례관리서비스 외 진행하는 치료 치료 중단 여부	<input type="checkbox"/> 예 (TRTYN=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (TRTYN=1)
	집중사례관리서비스 외 진행하는 치료 치료순응도	<input type="checkbox"/> Very good (TRTCA=1) <input type="checkbox"/> Good (TRTCA=2) <input type="checkbox"/> Fairly good (TRTCA=3) <input type="checkbox"/> Poor (TRTCA=4)
	외래 예약일	YYYY-MM-DD (APPDT)
	외래예약 ND	<input type="checkbox"/> Not Determined(ND) (APPDT_ND=1)
	방문여부(O,X)	<input type="checkbox"/> O (DTYN=1) <input type="checkbox"/> X (DTYN=2)
	실제 외래 진료일	YYYY-MM-DD (TRTDT)
	총 외래방문 횟수	(TRDTTOT)
생활사건 (Stressful Life Event)	지난 방문 이후 스트레스가 될 만한 안 좋은 생활 사건이 있었나요?	<input type="checkbox"/> 예 (SLEYN=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (SLEYN=2)
	'예'인 경우, 그 내용을 적으시오	(SLEY_ETC)
	그 생활사건이 환자의 생활에 얼마나 큰 영향을 주었습니까?	<input type="checkbox"/> 전혀 영향 없었음 (SLEEF=1) <input type="checkbox"/> 약간 영향 (SLEEF=2) <input type="checkbox"/> 중등도 영향 (SLEEF=3) <input type="checkbox"/> 심각한 영향 (SLEEF=4)
자살 시도 (Suicidal Attempt)	지난 방문 이후 자살 시도가 발생하였 습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (SAYN=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (SAYN=2)

도메인명(eCRF 명)	방문3, 방문4, 방문5, 방문6_집중사례관리서비스
--------------	------------------------------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Random배정 시 배정받은 시험군 또는 대조군 체크를 부탁드립니다.	지난 방문 이후 사례관리 서비스를 시행하였습니까?	<input type="checkbox"/> 예(시험군) (V3_ACMYN, V4_ACMYN, V5_ACMYN, V6_ACMYN=1) <input type="checkbox"/> 아니오(대조군) (V3_ACMYN, V4_ACMYN, V5_ACMYN, V6_ACMYN=2)
	상담유형	<input type="checkbox"/> 화상 (V3_ACMTYPE, V4_ACMTYPE, V5_ACMTYPE, V6_ACMTYPE=1) <input type="checkbox"/> 방문 (V3_ACMTYPE, V4_ACMTYPE, V5_ACMTYPE, V6_ACMTYPE=2) <input type="checkbox"/> 내원 (V3_ACMTYPE, V4_ACMTYPE, V5_ACMTYPE, V6_ACMTYPE=3)
지난 방문일 이후 현재 방문일까지의 기간동안 제공받은 집중사례관리 서비스를 기술하여 주십시오. (대면 또는 화상 상담)	상담대상	<input type="checkbox"/> 환자 (V3_ACMFAM, V4_ACMFAM, V5_ACMFAM, V6_ACMFAM=1) <input type="checkbox"/> 가족 (V3_ACMFAM, V4_ACMFAM, V5_ACMFAM, V6_ACMFAM=2)
	상담일자	YYYY-MM-DD (V3_ACMDT, V4_ACMDT, V5_ACMDT, V6_ACMDT)
	상담소요시간	분 (V3_ACMTM, V4_ACMTM, V5_ACMTM, V6_ACMTM)
	상담 총 횟수	회 (V3_ACMTOT, V4_ACMTOT, V5_ACMTOT, V6_ACMTOT)
	비대면 상담(전화/톡)	회 (V3_ACMUNT, V4_ACMUNT, V5_ACMUNT, V6_ACMUNT)
	기타(문자메시지/앱메시지)	회 (V3_ACMETC, V4_ACMETC, V5_ACMETC, V6_ACMETC)
	교육 및 프로그램(환자/가족 모두 포함)	회 (V3_ACMPRM, V4_ACMPRM, V5_ACMPRM, V6_ACMPRM)

<p>지난 방문일 이후 현재 방문일까지의 기간동안 제공받은 집중사례관리 서비스를 기술하여 주십시오. (대면 또는 화상 상담)</p>	<p>서비스 연계 및 모니터링(대면/비대면 면담 모두 포함)</p>	<p>회 (V3_ACMSRV, V4_ACMSRV, V5_ACMSRV, V6_ACMSRV)</p>
<p>집중사례관리 서비스 환자 만족도</p>	<p>제공받은 서비스 전반에 대해 만족하는 편이다.</p>	<p><input type="checkbox"/> 전혀 그렇지 않다 (V3_PRSTF, V4_PRSTF, V5_PRSTF, V6_PRSTF=1) <input type="checkbox"/> 그렇지 않다 (V3_PRSTF, V4_PRSTF, V5_PRSTF, V6_PRSTF=2) <input type="checkbox"/> 보통이다 (V3_PRSTF, V4_PRSTF, V5_PRSTF, V6_PRSTF=3) <input type="checkbox"/> 그렇다 (V3_PRSTF, V4_PRSTF, V5_PRSTF, V6_PRSTF=4) <input type="checkbox"/> 매우 그렇다 (V3_PRSTF, V4_PRSTF, V5_PRSTF, V6_PRSTF=5)</p>

도메인명(eCRF 명)	병용약물
--------------	------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

등록일 이후 우울증 및 자살 충동과 관련하여 함께 투여된 약물이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 예 (CMYN=1) <input type="checkbox"/> 아니오 (CMYN=2)	
	약물명	(CMNM)
	대표코드	(CMNM_대표코드)
	업체명	(CMNM_업체명)
	ATC_Code	(CMNM_ATC_CODE)
	약물명_기타	(CMNMETC)
	투여경로	<input type="checkbox"/> per oral(PO) (CMAR=1) <input type="checkbox"/> Intravenous(IV) (CMAR=2) <input type="checkbox"/> Intramuscular(IM) (CMAR=3) <input type="checkbox"/> Subcutaneous(SC) (CMAR=4) <input type="checkbox"/> Sublingual(SL) (CMAR=5)
	1일 투여량	(CMDOSE)
	투여시작일	YYYY-MM-DD (CMSDT)
	투여종료일	YYYY-MM-DD (CMEDT)
	지속여부	<input type="checkbox"/> 투여 지속 중 (CMING=1)
	중지사유	<input type="checkbox"/> 효과 결여 (CMSTP=1) <input type="checkbox"/> 복약순응도 결여 (CMSTP=2) <input type="checkbox"/> 내약성 결여 (CMSTP=3) <input type="checkbox"/> 치료 완료 혹은 증상 완화 (CMSTP=4) <input type="checkbox"/> 기타 (CMSTP=5)

도메인명(eCRF 명)	연구중단, 종결
--------------	----------

VISIT1	VISIT2	VISIT3	VISIT4	VISIT5	VISIT6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

연구중단, 종결	연구 종결일	YYYY-MM-DD (SEDT)
	연구 종료 현황	<input type="checkbox"/> 스크리닝 탈락 (SEND=1) <input type="checkbox"/> 중도 탈락 (SEND=2) <input type="checkbox"/> 연구 완료 (SEND=3)
	연구 중단 사유 발생일	YYYY-MM-DD (SESPDT)
	연구 중도 탈락 사유	<input type="checkbox"/> 선정제외기준 위반 (SECA=1) <input type="checkbox"/> 연구 참여 동의 철회 (SECA=2) <input type="checkbox"/> 사망 (SECA=3) <input type="checkbox"/> 자살 재시도 (SECA=4) <input type="checkbox"/> 추적 소실 (SECA=5) <input type="checkbox"/> 연구자 판단에 따라 더 이상 연구 진행이 어려운 경우 (SECA=6) <input type="checkbox"/> 기타 (SECA=7)
	연구 중도 탈락 사유_기타	(SECA_ETC)
연구자 서명	연구자 서명	(PICONFIRM)
	연구자 서명일	YYYY-MM-DD (PIDT)